

1 - Un cémenticule est:

- ☒ A- Une masse minéralisée d'origine tumorale se « déposant » sur la LAD.
- B- Une masse résultant de la résorption cémentaire, adhérant à la racine.
- ☒ C- Une masse minéralisée, appendue à la racine ou se trouvant dans le LAD.

2- Le contact prématuré :

- ☒ A- Représente un signe de malocclusion.
- B- Est une anomalie occlusale objectivée par l'analyse occlusale
- ☒ C- Est un obstacle sur le chemin de fermeture.

3- L'ostéoporose se caractérise par :

- A- Une condensation de la trame organique osseuse.
- B- Une douleur importante lors des mouvements, ainsi que des déformations
- ☒ C- Une raréfaction de la trame organique osseuse.

4- Le collagène est le principal constituant extra-cellulaire des tissus conjonctifs :

- ☒ A- Dont la proline est l'acide aminé spécifique.
- ☒ B- Au sein duquel la molécule de procollagène est répartie en 5 types de collagène.
- ☒ C- Synthétisé au niveau de la pulpe périphérique par le fibroblaste.

5- La liaison des chaînes alpha par groupes de trois :

- ☒ A- Sera assurée par les peptides de coordination riches en acides aminés semblables à ceux de la kératine.
- ☒ B- Ne s'établira qu'après la réalisation de ponts disulfurés entre les peptides de coordination.
- ☒ C- Représente une étape se réalisant au cours de l'hydroxylation de la molécule.

6- Au cours du phénomène de dégradation physiologique du collagène :

- ☒ A- On assiste à une destruction totale de la molécule, et son remplacement par une autre identique.
- ☒ B- On note l'apparition de collagénases sur toute la surface membranaire du fibroblaste.
- ☒ C- La digestion de la fibrille de collagène s'effectuera au niveau du phagosome.

7- Dans le sens vestibulo-lingual, le col interpapillaire :

- ☒ A- Aura une forme concave dans tous les secteurs des arcades dentaires.
- ☒ B- Prendra la forme pyramidale en fer de lance au niveau des dents antérieures, mais sera aplatie au niveau des molaires.
- ☒ C- Est une partie de gencive recouverte par un épithélium orthokératinisé.

8- A l'examen microscopique de l'épithélium jonctionnel, on notera présence de :

- ☒ A- Stratum germinatum - Stratum spinosum - Stratum granulosum - Stratum corneum.
- ☒ B- Stratum germinatum - Stratum spinosum - Stratum corneum.
- ☒ C- Stratum germinatum - Stratum granulosum - Stratum corneum.

9- Au niveau de l'attache épithéliale :

- A- L'innervation est abondante, atteignant toutes les couches cellulaires.
- B- Seules les couches cellulaires superficielles sont innervées.
- ☒ C- On ne dénombre qu'un nombre limité de cellules.

10- L'état picnotique d'une cellule :

- ☒ A- Signe sa mort programmée, et physiologique.
- B- Représente une reprise de l'activité cellulaire, après une phase de quiescence.
- C- Marque une activité mitotique au talent.

11- Les fibres de SHARPEY du LAD :

- ☒ A- Sont considérées comme étant la partie des fibres du collagène s'étendant entre le ciment et l'os alvéolaire.
- ☒ B- Est la partie terminale des fibres insérées d'une part sur le ciment et d'autre part sur l'os alvéolaire.
- ☒ C- Est une entité calcifiée.

12- Les fibres oxytalanées faisant partie des fibres retrouvées dans le LAD, jouent notamment un rôle :

- ☒ A- De défense contre les micro-organismes.
- ☒ B- De soutien au niveau de la région péri-apicale.
- ☒ C- Semblable à celui des fibres obliques.

13- A l'étude de l'os alvéolaire :

- ☒ A- On pourra constater cliniquement ; la présence de défauts, tel que les récessions et les fenestrations.
- ☒ B- Il est admis que les récessions sont des facteurs de risque d'apparition de déhiscences et de fenestrations.
- C- On notera une activité ostéogénique assurée par les cellules de ROUSEL.

14- Le degrés de viscosité le plus élevé, est retrouvé au niveau de :

- ☒ A- Glande parotide
- ☒ B- Glande sublinguale
- ☒ C- Glande sous-maxillaire

15- Les pâtes de dentifrice anti-tartre, agissent :

- A- En décalcifiant le tartre.
- ☒ B- En ralentissant le processus de calcification de la plaque par action sur les cations salivaires.
- C- En ralentissant le processus de calcification de la plaque par action sur les anions salivaires.

16- La salive joue un rôle prépondérant dans la dégustation des lipides et des protéines, notamment par l'intermédiaire de.

- A- La glande sublinguale.
- ☒ B- La glande parotide.
- C- La glande sous-maxillaire.

17- Parmi les enzymes pathogènes rentrant dans la composition du fluide gingival, on retrouve :

- A- Les arylsulfatases.
- B- Les élastases.
- C- L'hyaluronidase.

18- L'observation microbiologique de la cavité buccale montre :

- A- Une distribution uniforme des germes au niveau des différents compartiments.
- B- Une colonisation sélective des streptocoques mutans, et sanguis de toutes les dents lactéales.
- ☒ C- Un nombre important d'espèces bactériennes parodontopathogènes .

19- La flore de VEILLON constitue :

- A- La majorité de la flore salivaire.
- B- Un type de flore colonisant partiellement la région supra-gingivale.
- ☒ C- La majorité des espèces bactériennes odorifères .

Nom:

Prénom:

Salle/Place:

Matricule:

Date de naissance: / /

Corrigé type

Ce sujet co

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais. On ne peut pas une barre horizontale ou verticale ()

A B C

1. ☐ ☐ ☒

2. ☒ ☒ ☒

3. ☐ ☒ ☒

4. ☐ ☐ ☐

5. ☒ ☒ ☒

6. ☐ ☐ ☐

7. ☒ ☐ ☐

8. ☐ ☒ ☐

9. ☐ ☐ ☒

10. ☐ ☐ ☐

A B C

11. ☐ ☒ ☒

12. ☒ ☐ ☐

13. ☐ ☐ ☒

14. ☐ ☒ ☐

15. ☐ ☒ ☐

16. ☒ ☐ ☐

17. ☒ ☒ ☒

18. ☐ ☐ ☐

19. ☐ ☐ ☐

20. ☒ ☐ ☐

ResiDentaireTM

J. B. Bou
Chargé pl
[Signature]