

Département de médecine dentaire
 Service ODF : Pr Zoubiri
 Responsables du module : Pr Zoubiri-Dr Bentaleb- Dr Saber

Alger le 07/12/2016
 1ère EMD 4ème année
 11h30-12h00

15/07/17

Cocher la ou les réponses justes

Corrige

1-la rampe de Schwartz :

- permet de corriger une linguo version des incisives
- permet de corriger un articulé inversé latéral
- peut servir de rétention pour l'appareillage amovible
- nécessite un 0,7mm pour sa confection

2-le diagnostic différentiel permet :

- d'établir un plan de traitement
- de diagnostiquer deux anomalies identiques
- n'est pas indispensable dans le diagnostic positif
- permet d'établir le diagnostic étiologique

3-la myothérapie

- est une thérapie qui consiste à améliorer le tonus de certains muscles
- permet de rétablir un équilibre entre les muscles antagonistes
- obtient souvent des résultats définitifs
- n'obtient des résultats satisfaisants qu'avant l'âge de 8 à 9ans

4-l'agénésie des incisives latérales supérieures :

- est l'agénésie dentaire la plus fréquente
- nécessite une prise en charge pluridisciplinaire
- est très fréquente en présence d'une fente labio palatine
- nécessite une prise en charge tardive surtout chez l'enfant

5-En fin de traitement orthodontique, les rapports occlusaux de classe II sont acceptables :

- uniquement au niveau des canines
- au niveau des canines et des molaires
- uniquement au niveau des molaires
- avec des rapports incisifs de 2mm d'overjet et 2mm d'overbite

6-l'objectif fonctionnel principal est de :

- réduire la phonation
- faire seulement la rééducation non mécanique de la respiration
- faire la rééducation mécanique et non mécanique de toutes les dystonctions
- corriger la posture linguale

7- Le traitement de la DDM par macrodontie relative sans extractions consiste :

- en l'abstention thérapeutique si la DDM est ≤ -2 mm
- à faire des extractions pilotées
- à guider l'éruption si la DDM est de -3 ou -4 mm
- à conserver le Lee way par des moyens d'ancrage

8- Le traitement de la DDM par macrodontie relative avec extractions consiste à :

- faire des extractions pilotées par la méthode de Hotz
- réaliser un stripping des dents permanentes
- faire des extractions des dents délabrées
- réaliser une expansion dans le sens transversal par l'utilisation d'un Quad helix

9-Le crochet Adams :

- est un crochet de rétention et de stabilisation
- doit être confectionné avec du fil 0,6mm
- peut être utilisé comme ancrage pour déplacer une dent
- peut être utilisé pour mésialer une molaire

10-l'inclusion canine :

- peut être due à un hyper développement du prémaxillaire
- peut être associée à une agénésie de l'incisive latérale
- souvent en position palatine
- souvent bilatérale

11- Traitement de la DDD consiste :

- à faire des extractions pilotées.
- à réaliser un stripping en cas de macrodontie.
- à faire l'extraction d'une incisive latérale inférieure en cas de macrodontie.
- à réaliser un traitement cosmétique prothétique en cas de microdontie.

12-les objectifs de traitement sont établis d'après :

- le diagnostic étiologique seulement
- le diagnostic positif et le plan de traitement
- de la nature de l'anomalie orthodontique
- de l'examen clinique

13- Traitement de la DDM par microdontie relative consiste à :

- s'abstenir de toute thérapeutique si le profil est harmonieux.
- extraire les deuxième prémolaires.
- effectuer une thérapeutique fixe multi-attaches avec une restauration prothétique comme moyen de contention.
- extraire une incisive latérale inférieure.

14- l'harmonie du visage est un objectif esthétique obtenu par :

- un profil rectiligne
- un profil convexe équilibré
- un équilibre proportionnel des étages
- un bord libre des incisives supérieures ne dépassant pas 2mm au sourire

15- la rééducation neuro-musculaire consiste à :

- corriger un comportement musculaire erroné
- utiliser des appareillages mécaniques directs
- rétablir un schéma de croissance correct
- rétablir les fonctions après correction de la dysmorphose

16- Dans le cas de latérodéviation mandibulaire on utilise une plaque palatine avec :

- verin médian
- ailette unilatérale du côté de la déviation
- ailette unilatérale du côté opposé à la déviation
- deux ailettes de guidage

17- l'examen positif du patient se fait à partir :

- de l'examen radiologique
- du diagnostic étiologique
- du diagnostic différentiel
- de l'examen clinique et radiologique

18- P.E.L.N :

- est un appareillage fonctionnel à action directe
- permet la correction des déformations dento-squelettiques par la suppression des forces nocives
- est parfois utilisée après chirurgie orthognathique
- peut être utilisée comme moyen de contention

19- l'inclusion d'une incisive centrale supérieure :

- peut être d'origine infectieuse
- peut être due à une anomalie radiculaire de l'incisive latérale
- est l'inclusion la plus fréquente
- est souvent d'origine traumatique

20- Dans le cas d'un articulé inversé antérieur, on utilise :

- un plan incliné
- une plaque palatine et verin à action antéro-postérieure
- une plaque palatine et verin à action antéro-postérieure avec surélévation unilatérale
- une plaque palatine et verin à action antéro-postérieure avec surélévation bilatérale