

- Dans la deuxième phase du mouvement extrême postérieur, le déplacement condylien se réalise au niveau :.....  
.....
- Les maladies qui ne présentent aucune influence sur les parodontopathies sont :
  - a-ostéoporose.
  - b-lupus érythémateux disséminé.
  - c-syndrome de Down.
  - d-maladie de Crohn.
  - e-toutes les réponses sont justes.
  - f-toutes les réponses sont fausses.
- Dans les agencements intra-arcades, la courbe de Spee :
  - est une courbe postéro-antérieure.
  - est à concavité inférieure.
  - suit les sommets des cuspidés vestibulaires des dents supérieures.
  - ne comprends les dents antérieures.

*Cochez la ou les réponses fausses.*
- Le diabète insipide correspond à un problème dans la sécrétion de l'hormone antidiurétique (ADH) associé à une hyperglycémie.
  - a-vraie,
  - b-faux.
- Les différentes formes d'histiocytoseX sont :
  - a -maladie de Letterer.
  - b-syndrome de Papillon-Lefèvre.
  - c-maladie de Hand-Schuller-Christian.
  - d-granulome éosinophilique des os.
- Les abcès parodontaux multiples se retrouvent chez les patients :
  - a dont l'état général est bon.
  - b-avec un diabète non contrôlé.
  - c-déficient médicalement.
- Quels sont les quatre (4) facteurs qui prédisposent à la Gingivite Ulcéro-nécrotique :

# ResiDentaire®

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

- Quels sont les principaux indices utilisés en parodontologie ?

- L'enquête exposé-non exposé :

- a- porte sur une partie de groupe choisi atteint de la maladie.
- b- peut être plus rétrospective que prospective.
- c- offre un moyen simple d'étudier les causes des maladies.
- d- au départ les groupes de personnes sont indemnes de maladie.

- Avec quelle de ces bactéries parodontopathogènes l'helicobacter pylori a une bonne adhérence :

- a- porphyromonas gingivalis.
- b- bactéroïdes forsythus.
- c- fusobacterium nucleatum.
- d- treponema denticola .

- Inflammation modérée, gencive rouge, rouge bleuté , œdème, aspect vernissé, il existe un saignement provoqué au sondage.

-ça correspond à quel score de quel indice parodontal ?

a -Score :.....

b -Indice :.....

- Les mouvements masticatoires se situent :


- a -à l'intérieur des mouvements limites .
- b -lors du trajet habituel d'ouverture et de fermeture.
- c -lors des mouvements verticaux.
- d- toutes les réponses sont justes.



- **La péricoronarite aiguë :**
  - a-est dûe à une poche parodontale.
  - b- est en rapport avec la couronne d'une dent en éruption.
  - c-est rencontrée le plus souvent autour des troisièmes molaires mandibulaires.
- **le syndrome du septum :**
  - a-n'est pas douloureux.
  - b-peut être dû à la présence d'un corps étranger dans l'espace inter-dentaire.
  - c-peut être dû à une obturation débordante.
- **la pulpite à rétro :**
  - a-a une origine parodontale.
  - b-a une origine endodontique.
  - c-son traitement est endodontique.
  - d-son traitement est parodontal.
  - e-son traitement est endodontique et parodontal.
- **Dans la classification des furcations , la classe I de Glickman présente :**
  - a-des signes uniquement cliniques.
  - b-des signes uniquement radiologiques.
  - c-une atteinte du seul ligament.
  - d-une atteinte partielle du ligament et de l'os.
- **Selon Harrington, une lésion endo-parodontale vraie est définie par 3(trois) conditions :**
  - 
  - 
  -
- **La classification de la parodontite chronique se base sur 2(deux) critères :- .....**

**ResiDentaire<sup>TM</sup>**

Plateforme de QCM Médecine Dentaire



- **Donnez un titre au schéma :**

.....  
 .....

- **le trajet allant de «1 » à « III » est :**

a-un enregistrement :.....

b -un trajet :.....

c-un mouvement :.....

- **Decrivez la partie allant de « 1 » à II.**

- **Lors de l'incision , on observe la contraction des muscles :**

**ResiDentaire<sup>®</sup>**

Plateforme de QCM Médecine Dentaire