

. Le détartrage trouve son indication au cours :

- ✓ 1. Du traitement étiologique
- × 2. Du traitement chirurgical
- × 3. De la thérapeutique parodontale de soutien
- 4. Toutes les réponses sont fausses

. Le biofilm bactérien est sensible aux antibiotiques à large spectre :

Vrai

faux

. Au cours d'un détartrage, la sensibilité tactile du praticien est la plus importante avec :

- 1. Des instruments ultrasoniques
- × 2. Des instruments manuels
- 3. Des instruments soniques

. La profondeur de la poche parodontale se mesure :

- 1. Du rebord gingival à la jonction émail-cément
- 2. De la jonction émail cément au rebord gingival
- × 3. Du rebord gingival à la partie coronaire de l'attache épithéliale
- 4. De la jonction émail-cément au rebord osseux

. Les bains de bouches :

- 1. Sont efficaces contre les bactéries du biofilm
- 2. Sont indiqués dans le traitement de toutes les maladies parodontales
- 3. Sont prescrits dans le traitement du saignement gingival
- × 4. Toutes les réponses sont fausses

- La phase de maintenance trouve sa place
 - ✓ 1. Après le traitement d'urgence
 - ✗ 2. Après le traitement initial
 - ✗ 3. Après traitement chirurgical
 - 4. A la fin du traitement parodontal uniquement

- La chirurgie de la poche englobe les chirurgies suivantes :
 - 1. La frénectomie
 - ✗ 2. La gingivectomie
 - ✓ 3. Les lambeaux d'assainissement
 - 4. Les greffes gingivales

- Le détartrage est plus efficace quand il est réalisé :
 - ✗ 1. Par quadrant
 - 2. Par sextant
 - 3. Par la technique de « full mouth debridement »
 - 4. Toutes les réponses sont fausses

- Les rendez-vous de maintenance sont rapprochés chez :
 - ✗ 1. Les patients présentant une parodontite agressive
 - ✓ 2. Les patients diabétiques mal équilibrés
 - 3. Les patients non fumeurs
 - ✓ 4. Les patients présentant une gingivite

- L'antibiotique de choix dans le traitement de la parodontite agressive est :
 - 1. Amoxicilline
 - 2. Azithromycine
 - 3. Métronidazole
 - ✗ 4. Association amoxicilline métronidazole

- La réévaluation doit être faite après 4 à 8 semaines du traitement initial afin :
 - 1. D'avoir une cicatrisation de l'attache épithéliale et conjonctive
 - 2. D'avoir une cicatrisation de l'attache épithéliale uniquement
 - 3. D'éviter le surtraitement
 - ✗ 4. De juger la réponse tissulaire du patient

- Citez les critères bactériologiques dans le choix d'un antibiotique :

• spectre d'activité (agit sur une seule ou plusieurs bactéries)
• son rapport à la pathologie et aux bactéries responsables

Dans le brossage dentaire, les deux facteurs qui participent le plus dans l'apparition des lésions cervicales non carieuses :

1. La brosse à dent dure
2. Le brossage horizontal avec force
3. Le dentifrice abrasif
4. La brosse à dent électrique

ResiDentaireTM

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

En parodontologie la prescription des antibiotiques est indiquée dans le cas :

1. Gingivite induite par la plaque
2. Parodontite agressive
3. Parodontite chronique
4. Parodontite ulcère-nécrotique

Citez les facteurs participant dans la récurrence de la maladie parodontale

- traitement incomplet de l'odontopathe
- non respect de l'hygiène
- non respect de l'hygiène de nutrition et de vitamine
- maladie systémique ou locale qui affecte le parodont