

NOM

PRENOMS

SUJET DU 1^{ER} EMD DE PROTHESE (2^{eme} année) 2018 - 2019

Cocher la ou les réponses justes :

- 1) La prothèse conjointe peut être constituée :
- Par un inlay ou un onlay de recouvrement ;
 - Par une prothèse adjointe métallique ;
 - Par un bridge de courte portée de moyenne portée ou, de longue portée ;
 - Par une prothèse mobile totale.
- 2) L'onlay peut :
- Etre confectionné à l'aide d'alliages précieux ou non précieux ;
 - Concerner une face dentaire, deux faces dentaires ;
 - Concerner trois faces dentaires, quatre faces dentaires ;
 - Concerner cinq faces dentaires.
- 3) La couronne à incrustation vestibulaire peut :
- Etre entièrement métallique ;
 - Avoir une partie vestibulaire esthétique en résine ou en céramique ;
 - Etre indiquée pour restaurer des dents postérieures ;
 - Etre entièrement en résine ou en céramique.
- 4) La prothèse partielle à châssis métallique :
- Comporte une infrastructure métallique reliant tous les segments édentés ;
 - Comporte des crochets façonnés qui sont solidarisés à la résine située au niveau des segments édentés ;
 - Comporte des crochets coulés en même temps que l'armature métallique ;
 - Est une prothèse inamovible.
- 5) Dans une prothèse à armature métallique :
- Les crochets possèdent un appui occlusal direct qui empêche l'enfoncement de la prothèse ;
 - Les crochets possèdent un calage en résine au niveau palatin ou lingual ;
 - Des grilles ou des selles destinées à supporter les dents ;
 - Une plaque base en résine acrylique.

ResiDentaire®

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

- 6) Kennedy a établi une classification simple en fonction :
- Du nombre de dents restantes après extraction ;
 - Du nombre de dents présentes sur l'arcade ;
 - Du nombre de segments édentés ;
 - De la partie édentée sur l'arcade ;

- 7) La classification de Kennedy comporte :
- 4 classes sans modifications ;
 - 4 classes avec modifications ;
 - 6 classes avec modifications ;
 - 6 classes sans modifications ;

- 8) La classification de Kennedy-Applegate comporte :
- 6 classes d'édentement sans modifications ;
 - 6 classes d'édentement avec modifications ;
 - Tient compte de la présence de la canine pour la classe V ;
 - Tient compte de l'absence de la canine pour les classes III et VI ;

- 9) Les tori mandibulaires :
- Sont des exostoses situées au niveau de la table interne en regard des apex des prémolaires ;
 - Peuvent s'opposer à l'insertion de la prothèse ;
 - Sont des indices positifs à exploiter ;
 - Toutes les réponses sont justes ;

- 10) Zones de Schroeder :
- Dans ces zones, la fibre muqueuse est adhérente à l'os sous-jacent ;
 - Sont des indices biologiques positifs ;
 - Se situent de part et d'autre du raphe médian dans la partie postérieure du palais ;
 - Doivent être déchargées par la prothèse ;

- 11) La papille rétro-incisive :
- Est constituée par le paquet vasculo-nerveux issu du trou palatin antérieur ;
 - Est située sur la table interne de la mandibule, en arrière des incisives ;
 - Doit être déchargée ou contournée par la prothèse amovible métallique ;
 - Toutes les réponses sont fausses ;

- 12) Les papilles bunoides :
- Sont situées de part et d'autre de la ligne médiane, dans la région antérieure du palais dur ;
 - Sont exploitées pour la rétention de la prothèse ;
 - Sont des indices positifs ;
 - Interviennent dans la phonation et la gustation ;

ResiDentaire

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

1

- 13) Le raphé médian :
- Il s'agit de la suture des os formant la mandibule ;
 - Il est recouvert d'une fibro-muqueuse très fine et peu compressible ;
 - Est un indice positif ;
 - Toutes les réponses sont fausses.

- 14) La position d'intercuspidation maximale est une :
- Position mandibulaire de référence physiologique ;
 - Position de protrusion mandibulaire ;
 - Position de référence maxillaire ;
 - Position qui se caractérise par le maximum de contact inter-arcades.

- 15) La relation centrée est une référence condylienne utilisée :
- En absence de la fonction de calage ;
 - En absence de référence dentaire ;
 - Lorsque le calage dentaire est fonctionnel ;
 - Lorsque la fonction de guidage est efficace.

- 16) Dans l'affrontement interarcade en IOM le recouvrement ou over-bite :
- Concerne les dents antérieures ;
 - Concerne les dents postérieures ;
 - Se caractérise par un rapport d'une dent sur deux, rapport spécifique cuspide-fosse ou cuspide-embrasure ;
 - Se mesure sur la face vestibulaire des incisives inférieures, sa valeur est de 2 mm, mis en évidence par le trait tracé au crayon noir suivant le bord libre des incisives centrales supérieures.

- 17) Dans les classes dentaire d'Angle, la classe 1 (d'angle) la première molaire mandibulaire est en :
- Position mésiale d'une $\frac{1}{2}$ cuspide par rapport à la première molaire maxillaire ;
 - Position distale d'au moins une $\frac{1}{2}$ cuspide ;
 - Position mésiale d'au moins une $\frac{1}{2}$ cuspide ;
 - Position de bout à bout où le contact s'établit entre la cuspide mandibulaire contre la cuspide maxillaire.

- 18) La dimension verticale correspond à :
- La hauteur de l'étage inférieur de la face ;
 - La hauteur de l'étage supérieur de la face ;
 - La hauteur de l'étage moyen de la face ;
 - L'espace libre d'inocclusion.

3

- est située sur la table interne de la m...
- Doit être déchargée ou contournée ;
- Toutes les réponses sont fausses.

- 12) Les papilles bunoides :
- Sont situées de part et d'autre de...
 - Sont exploitées pour la rétention ;
 - Sont des indices positifs ;
 - Interviennent dans la phonation

2

19) Donne la définition actuelle de la relation centrée. Les incisives centrales supérieures et inférieures sont en contact simultané et transverse. La relation est dans un état d'occlusion. Mandibulaire des incisives centrales supérieures sur la table interne de la molaire.

- 20) En prothèse totale :
- Le lien entre tout les segments édentés ;
 - Les dents utilisées peuvent être en ré...
 - La rétention est assurée par des crochets ;
 - La prothèse permet de corriger toute...

4

19) Donnez la définition actuelle de la relation centrée : par le collage d'occlusion de la relation centrée et ;

- la situation la plus haute du complexe condylo-discal contre l'éminence temporale ;
- simultanée et transversalement stabilisée
- répétitive dans un temps donné et dans une posture corporelle donnée ;
- indépendante des positions dentaires ou de la DV ;
- enregistrée sur le trajet du mouvement de rotation pure suggéré et contrôlé manuellement par le praticien

20) En prothèse totale :

- Le lien entre tout les segments édentés est une plaque base en résine acrylique ;
- Les dents utilisées peuvent être en résine ou en céramique ;
- La rétention est assurée par des crochets ;
- La prothèse permet de corriger toutes les malpositions dentaires.

ResiDentaire®

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

