

Cocher la ou les réponses justes

1) Le montage des dents artificielles :

- Est une étape clinique
- Est une étape de laboratoire
- Consiste à modifier les dents naturelles
- Consiste à placer des dents artificielles antérieures et/ou postérieures sur des maquettes en cire.

2) Le montage ajusté en prothèse partielle amovible :

- C'est un montage qui intéresse les dents postérieures
- Se fait sur une fausse gencive en cire
- Est indiqué pour des raisons esthétiques
- Les dents sont ajustées directement sur les crêtes alvéolaires

3) Le montage des dents postérieures :

- La première et la deuxième prémolaire sont en contact avec le plan d'occlusion prothétique
- La première molaire supérieure est en contact avec le plan d'occlusion prothétique par sa cuspide disto palatine
- La courbe de Wilson est formée par les dents supérieures
- La deuxième molaire supérieure n'est pas en contact avec le plan d'occlusion prothétique

4) Le montage en normo occlusion :

- Correspond à la classe I d'Angle
- Correspond à la classe II d'Angle
- Correspond à la classe III d'Angle
- La première molaire inférieure est mésialée d'une demi cuspide par rapport à la molaire supérieure

5) La finition de la cire concerne :

- La ligne des collets qui doit être tracée en harmonie avec celle des dents naturelles
- La fausse gencive qui doit être sculptée
- La cire qui doit être lisse et brillante
- Toutes les réponses sont fausses

Toutes les réponses sont fausses

6) En prothèse partielle amovible métallique :

- Les parties saillantes des surfaces d'appui doivent être déchargées
- Le décolletage n'est pas systématique
- Le décolletage concerne uniquement les dents support
- Un décolletage de 2 mm à l'arcade supérieure est suffisant.

7) En prothèse partielle amovible métallique :

- La sustentation s'oppose à l'éloignement de la prothèse de la surface d'appui.
- La sustentation augmente lorsque la plaque est pleine et large.
- Les taquets occlusaux et cingulaires ne jouent aucun rôle dans la sustentation
- Le polygone de La sustentation est la surface limitée par toutes les lignes de La sustentation.

8) En prothèse partielle amovible métallique :

- La rétention est assurée par le bras rétentif du crochet sur la zone de dépouille des dents piliers.
- Le système d'attache de précision ne nécessite pas l'utilisation de prothèse fixée.
- Les mouvements de Tabet touchent les trois plans de l'espace.
- Les mouvements de Tabet concernent surtout les édentements intercalés.

9) En prothèse partielle amovible métallique :

- La stabilisation intéresse seulement les mouvements de transiation
- Les parties rigides des crochets et des connections secondaires contrôlent la stabilisation
- Un recouvrement maximal des crêtes trigones et tubérosités n'augmentent pas la stabilisation.
- Les mouvements déstabilisant la prothèse sont développés lors de la mastication.

10) La connexion principale au maxillaire :

- Est aussi appelée armature métallique
- Elle doit être asymétrique
- Est utilisée en prothèse provisoire en résine
- Doit être à distance de la gencive marginale et des dents restantes, grâce au décolletage de 5 mm.

11) Le bandeau lingual :

- Est indiqué lorsque la distance entre le cingulum des dents et l'insertion du frein lingual est supérieur à 7mm.
- Son intrados est espacé de 0,5 mm de la gencive marginale et de la table interne.
- Est utilisé au maxillaire
- Est une connexion secondaire.

12) Le crochet Ackers :

- Présente un appui occlusal et une conjonction secondaire du côté de l'édentement.
- Est indiqué dans les édentements de classe I et II de KENNEDY APPLÉGATE
- Est un crochet façonné avec du fil de jonc grâce aux pinces.
- Est un crochet rigide.

13) Crochet Nally-Martinet :

- A une connexion secondaire mésiale et un appui occlusal direct mésial.
- Est indiqué dans les édentements intercalés
- Est un crochet double
- Toutes les réponses sont justes.

14) les crochets à Liaison Rigide sont des crochets :

- Reliés directement à la selle par une jonction indéformable.
- Indiqués pour les édentements encastrés.
- Indiqués pour les édentements terminaux.
- A connexion secondaire située du côté de l'édentement.

15) les crochets à Liaison semi-rigide sont des crochets :

- Indiqués pour les édentements de classe I et II.
- A connexion secondaire reliés directement au châssis prothétique.
- Ayant un appui occlusal décalé vers l'avant par rapport à l'édentement.
- Qui ne permettent pas de respecter la dualité tissulaire.

**ResiDentaire**<sup>®</sup>

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

16) le système d'attache utilisée en PFAC:

- Est un élément mécanique préfabriqué reliant la prothèse amovible à la dent naturelle.
- Permet d'assurer la rétention par friction entre la partie mâle et femelle de l'attachement.
- Quand il est semi-rigide, est indiqué pour les édentements de classe I et II.
- Toutes les réponses sont justes.

17) les attachements à liaison Rigide sont des attachements :

- Toujours intracoronnaires.
- Indiqués uniquement pour les édentements encastrés.
- Qui permettent d'absorber les contraintes occlusales exercées sur la PPAC.
- Indiqués aussi bien pour les édentements distaux que pour les édentements encastrés.

18) La ligne du plus grand contour :

- C'est l'ensemble des points les plus saillants d'un corps par rapport à son axe longitudinal.
- Sera positionnée différemment, et sera en fonction de l'inclinaison du corps.
- C'est la trace laissée sur les faces latérales d'une dent par la génératrice tangentielle toujours parallèle à elle-même et à l'axe d'insertion.
- Doit se situer le plus proche possible du bord occlusal.

19) L'axe d'insertion :

- Est la voie optimale selon laquelle la prothèse va s'insérer et se désinsérer.
- Est dit favorable lorsqu'il nécessite des meulages importants.
- Est le résultat d'un compromis entre la rétention, l'esthétique les interférences et les surfaces de guidage.
- Est toujours simple.

20) Le paralléliseur joue un rôle :

- Uniquement au cabinet dentaire.
- Au laboratoire en vue de l'établissement du plan de traitement et des modifications pré prothétiques.
- Pour détecter les zones de retrait sur toutes les dents de l'arcade.
- Dans le positionnement des attachements.

# ResiDentaire®

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

# Epreuve de Prothèse - 2ème - année de médecine dentaire -2020/2021

Date de l'épreuve : 12/04/2021

Page :

Corrigé Type

Barème variable par question

N°	Rép.	Barème
1	BD	1
2	CD	1
3	AD	1
4	AD	1
5	ABC	1
6	A	1
7	BD	1
8	C	1
9	BD	1
10	AD	1
11	B	1
12	AD	1
13	A	1
14	ABD	1
15	ABC	1
16	BC	1
17	BC	1
18	AB	1
19	AC	1
20	D	1
21		0
22		0
23		0
24		0
25		0
26		0
27		0
28		0
29		0
30		0
31		0
32		0
33		0
34		0
35		0

N°	Rép.	Barème
36		0
37		0
38		0
39		0
40		0

# ResiDentaire®

Plateforme de QCM Médecine Dentaire