

# ResiDentaire<sup>®</sup>

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

Cocher la ou les réponses justes

- La chirurgie pré-prothétique :
  - Est une mise en condition chirurgicale qui consiste à l'aménagement des tissus gingivaux et muqueux seulement.
  - Est une mise en condition tissulaire qui consiste à améliorer l'état des tissus en se servant des conditionneurs
  - Elle est systématiquement suivie de la mise en condition tissulaire
  - Toutes les irrégularités sont éliminées.
  - Fréquemment indiquée chez les sujets assez âgés
  
- Parmi les indications actuelles de la chirurgie pré-prothétique:
  - L'approfondissement du vestibule.
  - Un torus de 08mm au niveau du 1/3 moyen du palais.
  - Le remodelage des apophyses génées.
  - La régularisation des crêtes osseuses.
  - Hypertrophie tubérositaire dans le sens vertical (hauteur importante)
  
- L'altération de la fibre-muqueuse buccale :
  - Ne doit être corrigée que par une chirurgie pré-prothétique.
  - Peut être source d'erreur lors de l'enregistrement de la dimension verticale et de l'occlusion
  - Peut être associée à une perte osseuse
  - Peut être due à une mauvaise conception prothétique.
  - Toutes les réponses sont justes.
  
- La mise en condition tissulaire:
  - Est toujours réalisée avec une prothèse temporaire.
  - Est précédée d'un traitement étiologique.
  - Nécessite plusieurs séances.
  - Permet de guider la cicatrisation après une chirurgie pré prothétique.
  - Toutes les réponses sont justes.

- Le rôle du POP est
  - De rétablir l'esthétique
  - D'assurer une phonation et mastication correcte
  - D'assurer la permanence de la stabilité des prothèses sur les surfaces d'appui aussi bien en occlusion centrée, et en excentrée
  - De respecter l'intégrité des surfaces d'appui
- ✓ - Toutes ces réponses sont justes

Lors du réglage du POP, on prend comme référence :

- L'esthétique du patient
- ✗ - Le plan de can per
- Le plan de Frankfurt
- Le plan de Wilson
- ✓ - Le plan bi-pupillaire

- Chez l'édenté total la régulation de la mastication est assurée par :

- ✓ - La proprioception
  - L'extéroception
  - La proprioception et l'extéroception
  - Toutes les réponses sont justes
- Les condyles de l'édenté total
- Effectuent un mouvement de rotation autour d'un point
  - ✗ - Effectuent un mouvement en charnière
  - Effectuent un mouvement de translation
  - Toutes les réponses sont fausses
- Un filament salivaire continu est signe de
- ✗ - D'une bonne adhésion
  - D'une adhésion moindre
  - D'une inflammation muqueuse
  - D'une résorption sévère

- La fibromuqueuse recouvrant les crêtes résiduelles sera palpée pour évaluer

- ✗ - Son adhérence
- Son étendu
- Sa couleur
- ✗ - Son épaisseur

**ResiDentaire** <sup>®</sup>

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

- Le matériau de mise en condition tissulaire est
  - Une résine à prise retardée qui présente une plasticité secondaire
  - Formé d'une poudre polymère de méthacrylate d'éthylène
    - Versé immédiatement après spatulation sur l'intrados de la prothèse
  - Appliqué d'une façon temporaire uniquement au niveau de l'intrados de la prothèse
    - Caractérisé par son action agressive et compressive sur les muqueuses

- La mise en condition tissulaire (MCT):

- Réduit les erreurs d'occlusion
- Dans le cas de dimension verticale sous-évaluée une couche de matériau de MCT peut être rajoutée
- Augmente l'espace bio fonctionnel et la surface d'appui prothétique
- Le matériau de MCT dégarnit sur la prothèse signe des zones de compression
- Toutes les réponses sont justes.

- La dimension verticale (DV) :

Vous livrez une prothèse, vous faites l'examen de la valeur phonétique, au cours de l'émission des bilabiales et sifflantes, vous jugez qu'il y'a un trouble (un chuintement) vous pensez à :

- Une DVO surévaluée
- Une DVO sous-évaluée
  - Une Prothèse supérieure instable
  - Une DVR diminuée
  - Aucune réponse n'est juste.

**ResiDentaire<sup>®</sup>**  
Plateforme de QCM Médecine Dentaire

- Une dimension verticale d'occlusion (DVO) est caractérisée par :

- Une béance labiale
- Un claquement des prothèses
- Des perlèches au niveau des commissures labiales
  - Une hypertension des muscles labio-jugaux
- Toutes les réponses sont justes.

- Pour déterminer la DVO ; l'évaluation de choix est la technique :

- Indirecte
- Phonétique
- Willis
  - Céphalométrique
  - Esthétique

- En prothèse amovible complète, l'examen radiologique panoramique nous informe sur
  - a - Le degré de résorption
  - b - Les éléments intra osseux
  - c - Le système articulaire
  - d - Le choix des thérapeutiques amovibles
  
- A la mandibule le porte empreinte de série doit
  - a - Recouvrir les ligaments ptérygo-maxillaire
  - b - Recouvrir les tubérosités
  - c - Être distant de la frange sublinguale
  - d - Recouvrir les lignes coliques internes
  - e - Toutes les réponses sont fausses
  
- Le choix du porte empreinte de série se fera selon
  - a - Le matériau à empreinte
  - b - La dimension de la crête résorbée
  - c - La forme de la crête résorbée
  - d - Toutes les réponses sont justes
    - Les empreintes primaires au plâtre
    - Exigent une coulée rapide
    - e - Exigent des portes empreintes lisses
    - f - Exigent l'absence de contre dépouilles
      - Sont compressives
      - Toutes les réponses sont fausses
  - e - L'empreinte secondaire
    - Est une empreinte macrostatique
    - Est réalisée avec de l'alginat
    - f - Sera coffrée avant d'être coulée
      - Toutes les réponses sont justes