

UNIVERSITE D'ALGER
DEPARTEMENT DE MEDECINE DENTAIRE
EXAMEN DE PROTHESE DENTAIRE
PREMIERE E.M.D
TROISIEME ANNEE 2019-2020

Cochez la ou les réponses justes.

- 1- Connaitre la personnalité des patients est :
- A- Sans importance pour le déroulement du traitement prothétique. ✗
 - B- Impératif pour adapter le discours et la prise en charge à chacun d'entre eux.
 - C- Essentiel pour établir un plan de traitement adéquat.
 - D- Toutes les réponses sont fausses.
- 2- En prothèse amovible complète, l'examen radiologique panoramique nous informe sur : ✓
- A- Le degré de résorption.
 - B- Les éléments intra osseux.
 - C- Le système articulaire.
 - D- Le choix des thérapeutiques amovibles.
- 3- Si l'examen clinique d'un édenté total révèle 2 tubérosités ce contre dépouille : ✓
- A- La chirurgie pré-prothétique est toujours osseuse.
 - B- La chirurgie pré-prothétique peut être muqueuse.
 - C- L'intervention concerne généralement une seule tubérosité.
 - D- L'intervention concerne les 2 tubérosités.
- 4- Les muscles masticateurs sont : ✓
- A- Les muscles élévateurs.
 - B- Les muscles abaisseurs.
 - C- Les muscles de la mimique.
 - D- Les muscles de la déglutition. ✗
- 5- Les fossettes palatines : ✓
- A- Constituent un repère pour la limite postérieure de la prothèse.
 - B- Doivent être toujours visible.
 - C- Se trouvent de part et d'autre de la suture intermaxillaire.
 - D- Toutes les réponses sont justes.
- 6- Le muscle buccinateur :
- A- Est situé dans l'épaisseur des joues.
 - B- Forme la poche de FISH. ✗
 - C- Est un muscle propulseur. ✗
 - D- Est un muscle élévateur. ✗
- 7- Le but de la mise en condition fissulaire est :
- A- De créer un coussin amortisseur entre l'intrados prothétique et la muqueuse.
 - B- D'augmenter l'espace bio-fonctionnel qui sera occupé par la prothèse.
 - C- D'assurer un montage esthétique. ✗
 - D- toutes les réponses sont justes. ✗

8. La radiographie est :

- A. Une technique de mise en condition neuro articulaire. ✓
- B. Une technique de mise en condition articulaire. X
- C. Une technique de mise en condition musculaire. X
- D. Toutes les réponses sont fausses.

9. Lors de la réalisation du bourelet supérieur :

- A. La forme doit respecter le contour de l'arcade. ✓
- B. Son épaisseur sera de 4mm dans la région antérieure, et atteindra 8 à 10mm au niveau des premières molaires. X
- C. Son épaisseur sera de 8 mm dans la région antérieure, et atteindra 10 à 12mm au niveau des premières molaires. ✓
- D. Son épaisseur dans la région antérieure sera égale à celle au niveau des premières molaires. X

10. Les segments postérieurs du bourelet supérieur sont réglés :

- A. Parallèlement au plan de référence défini par Camper. ✓
- B. Perpendiculairement au plan de référence défini par Camper. X
- C. Parallèlement au plan de référence défini par Frankfurt. X
- D. Parallèlement au plan de référence bi pupillaire. X

11. Le ligament ptérygo-maxillaire :

- A. Se tend à l'ouverture buccale. ✓
- B. Ne doit pas être recouvert par la prothèse maxillaire. X
- C. Constitue la limite postérieure de la prothèse inférieure. X
- D. Les 2 propositions A et B sont fausses. X

12. La limite postérieure du porte-empreinte individuel maxillaire doit se terminer :

- A. En avant de la ligne de flexion du voile. ✓
- B. En avant des fossettes palatines. X
- C. Les 2 propositions A et B sont vraies. X
- D. Les 2 propositions A et B sont fausses. X

ResiDentaire[®]

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

13. La réalisation du joint périphérique en PTA :

- A. Est sectorielle. ✓
- B. Se fait avec un porte empreinte individuel issu d'une empreinte secondaire. X
- C. Se fait avec la pâte de Kerr. ✓
- D. Se fait avec la pâte à oxyde de zinc eugéniol. X

14. Le calcul de la DV par la technique de Willis se fait avec un compas pour :

- A. Rechercher une égalité entre la distance fente labiale/ angle externe de l'œil et la distance point sous nasal/ gnathion. ✓
- B. Rechercher une égalité entre la distance Tragus/ gnathion et la distance ligne bi-pupillaire/ fente labiale. X
- C. Rechercher une égalité entre la distance fente labiale/ point sous nasal et la distance angle externe de l'œil/ gnathion. X
- D. Aucune réponse n'est juste. X

ResiDentaire®

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

15- Le traitement implantaire à la mandibule doit tenir compte de :

- A- L'âge du patient. ✓
- B- L'échec des thérapeutiques amovibles. ✓
- C- L'intérêt du patient pour ce type de traitement. ✓
- D- La situation sociale du patient. ✗

16- La réaction de prise de la résine à prise retardé se déroule en quatre phases successives :

- A- Phase de gel, phase plastique active, phase plastique passive, phase de dessiccation. ✗
- B- Phase de gel, phase élastique, phase plastique active, phase de dessiccation.
- C- Phase élastique, phase plastique active, phase plastique passive, phase physique (gel). ✗
- D- Phase physique (gel), phase plastique active, phase élastique, phase de dessiccation. ✓

17- La position physiologique de repos est :

- A- La position d'équilibre tonique du complexe musculaire avec un espace libre d'inocclusion égal en moyenne à 2mm. ✓
- B- La position d'équilibre tonique du complexe musculaire avec une occlusion équilibrée d'intercuspidation maximale. ✗
- C- Est la somme de l'espace libre d'inocclusion égal en moyenne à 2mm et l'occlusion d'intercuspidation maximale. ✓
- D- Toutes les réponses sont justes. ✗

18- L'empreinte non compressive au plâtre est indiquée en cas :

- A- De crêtes peu résorbées de classe I et II. ✓
- B- D'une corticale osseuse lisse et régulière. ✗
- C- D'une fibro-muqueuse saine et adhérente. ✓
- D- Les 3 propositions A, B, C sont fausses. ✗

19- L'empreinte préliminaire anatomo-fonctionnelle compressive avec un matériau thermoplastique est indiquée :

- A- En présence d'une surface d'appui osseuse irrégulière. ✓
- B- Lorsque la fibro-muqueuse est d'une épaisseur variant d'un point à un autre. ✓
- C- En présence d'une crête flottante. ✗
- D- Lorsque la crête est très résorbée. ✓

20- Les empreintes à la pâte d'oxyde de zinc-eugéol sont recommandées :

- A- Dans les cas de palais trop profonds. ✗
- B- En présence de fortes contre-dépouilles. ✗
- C- Les 2 propositions A et B sont vraies.
- D- Les 2 propositions A et B sont fausses. ✓