

Corrigé type

➤ La relation centrée est :

- La position la plus reculée des condyles dans leurs cavité glénoïde.
- La position la plus haute des condyles dans leurs cavité glénoïde.
- Imposée au patient par un guidage forcé.
- une position reproductible.
- Toutes les réponses sont justes.

(1, 2)

➤ A la détermination de la relation centrée succède :

- La détermination de la dimension verticale.
- La détermination du plan d'occlusion.
- La solidarisation des deux maquettes.
- Toutes les réponses sont justes.

(1)

➤ Lors du dévissage symétrique :

- Un contact prématuré unilatéral en est la cause.
- Des recarifications se feront au dépens de la maquette supérieure.
- Il se produit une contraction des ptérygoidiens externes.
- La maquette inférieure va glisser vers l'avant.
- Toutes les réponses sont justes.

(1)

➤ La bonne adaptation d'une prothèse totale :

- Dépend de la précision des matériaux à empreinte.
- Dépend de la qualité d'empreinte.
- Est vérifiée par une pression airtelle qui ne doit dégager aucun bruit d'échappement d'air.
- Dépend des phases techniques de l'élaboration prothétique.
- Toutes les réponses sont justes.

(1)

➤ La valeur mécanique des prothèses totales dépend :

- De la bonne adaptation.
- De la rétention.
- De la stabilité statique uniquement.
- De la stabilité dynamique.
- Toutes les réponses sont justes.

(1, 2)

➤ La morsure des joues est corrigée par :

- Epaissement du versant vestibulaire de la prothèse inférieure.
- Epaissement du versant vestibulaire de la prothèse supérieure.
- Adoucissement de la cuspidé vestibulaire de la molaire supérieure.
- Rétrécissement du diamètre mesio-distal de la molaire inférieure.
- Toutes les réponses sont fausses.

(1, 2)

➤ Les réactions douloureuses en occlusion centrée sont dues à :

- La morsure des joues.
- Une surcharge occlusale.
- Une ligne oblique interne saillante.
- Des insertions musculaires insuffisamment libérées.
- Toutes les réponses sont justes.

(1)

➤ Après insertion des prothèses totales en bouche, il est conseillé au patient de :

- S'habituer à manger avec ses prothèses nouvelles les premiers jours.
- Porter ses prothèses 24h/24h.
- Retirer ses prothèses le soir et les mettre dans un verre d'eau.
- Croquer des aliments durs pour faciliter l'adaptation.
- De nettoyer ses prothèses après chaque repas avec une brosse dure et de l'eau savonneuse.

(1)

Corrigé type

- > On trace sur le modèle supérieur :
- Le plan sagittal médian
 - La ligne de la crête faitière
 - La zone antérieure de sustentation comprise entre le sommet de la crête antérieure et le fond du vestibule (aire d'ACKERMANN)
 - La position de la pointe des canines
- > Les dents en résines sont indiquées dans les cas suivants :
- Présence des dents antagonistes naturelles fortement abrasées
 - Cas où les dents antagonistes naturelles ne sont pas abrasées
 - Présence des dents antagonistes naturelles atteintes d'une parodontopathie
 - Présence des crêtes flottantes
- > La résorption nasale est :
- Plus importante au maxillaire qu'à la mandibule
 - Centripète au maxillaire et centrifuge à la mandibule
 - Réversible et peut être stoppée
 - Toutes les réponses sont justes
- > L'air de sustentation d'Ackermann correspond :
- A la région antérieure et latérale du maxillaire
 - A la région sub-linguale
 - A la zone comprise entre le sommet de la crête antérieure et le fond du vestibule mandibulaire
 - Toutes les réponses sont fausses
- > Lors de l'essai fonctionnel en PTA, on commence toujours par :
- La vérification de la relation inter-arcade
 - L'essai esthétique
 - L'essai mécanique
 - L'essai phonétique
- > Une erreur d'enregistrement de la relation centrée est corrigée lors de l'essai fonctionnel par :
- Une correction du montage des dents antérieures
 - Un nouvel enregistrement de la relation inter arcade
 - Une correction du plan d'occlusion prothétique
 - Une reprise de l'empreinte secondaire
- > Au cours de l'essai fonctionnel, une pression digitale sur le bord libre des incisives supérieures si elle provoque un basculement de la maquette cela veut dire que :
- La situation des groupes prémolo-molaires est trop vestibulée
 - Le plan d'occlusion prothétique est erroné
 - Le joint postérieur est insuffisant ou mal situé
 - La dimension verticale est incorrecte
- > Lors du contrôle des maquettes du montage, la position des bords libres des incisives supérieures est mise à l'épreuve phonétique lors des émissions :
- Des labio-dentales
 - Des dento-dentales
 - Du K
- > Le bourrage est :
- L'insertion de la résine à l'état élastique dans la contre partie du moufle recouvrant ainsi les dents
 - L'insertion de la résine à l'état plastique dans la contre partie du moufle recouvrant ainsi les dents
 - La séparation des deux parties du moufle
 - L'application de l'isolant au niveau du plâtre

> L'isolation est :