

Cochez les une ou deux réponses justes.

1- Le dessin préparatoire des prothèses complètes amovibles dépend :

A. Des habitudes.

B. Des l'entraînement et de la symétrie des bouches maxillaires ou mandibulaires.

C. Des particularités physiques de l'entraînement.

D. Des différences entre les deux types de prothèses complètes amovibles.

2- La détermination des prothèses amovibles permanentes pour la dentition permanente ou temporaire est basée sur :

A. Les habitudes.

B. Les habitudes d'opposition des dents.

C. Les habitudes d'opposition des dents mandibulaires.

D. Les habitudes d'opposition des dents maxillaires.

3- Les indications d'usage neutre sont :

A. Constituées pour les éclusières démontables qui nécessitent exercice de la déglutition. *

B. Elles sont utilisées lorsque l'entame maxillaire et la cassure mandibulaire suffisamment étendues. *

C. Elles sont utilisées dans les cas de maladie.

D. Elles sont utilisées pour les personnes portant des appareils orthodontiques.

4- La détection des zones douloureuses le jour de l'insertion des prothèses complètes va faire que :

A. Exiger une pression constante sur les dents.

B. Utiliser un siliconne flexible.

C. Toutes les réponses sont fausses.

5- Le décollement postérieur de la prothèse maxillaire lors d'une pression digitale sur les incisives est dû à :

A. Un montage incorrect des inclusives.

B. Un joint postérieur insuffisant.

C. Un joint postérieur mal situé.

D. Un joint para-tubérositaire erroné.

6- Lors de la préparation de la résine en vue d'une mise en moufle, la phase de gel plastique correspond :

A. Un mélange collant. *

B. A une masse non adhérente au récipient ni aux doigts. *

C. La résine du bourrage.

D. Toutes les réponses sont justes.

7- Lors de la mise en moufle, les isolants :

A. Doivent être solubles dans l'eau. *

B. Facilitent le démouillage.

C. N'ont aucun lien avec le risque de porosité. *

D. Doivent faciliter l'infiltration du monomère dans le plâtre. *

8- Au cours de la mise en moufle :

A. Une fois sous pression, le moufle doit être pressé rapidement.

B. La résine est modelée et déposée sur le sommet de la crête. *

C. La polymérisation débute dans l'eau froide. *

D. Toutes les réponses sont justes.

9- L'harmonie du visage, et le rétablissement du sourire dépendront :

A. De la hauteur de l'étage inférieur.

B. De l'orientation et la position des dents artificielles.

C. Du choix des dents prothétiques.

D. Du caractère de la fausse gencive.

10- La détermination de la relation centrée impose de respecter les préalables suivants :

A. Le patient est confortablement installé.

B. Les maquettes d'occlusion doivent être stables, rigides et rétentives.

C. La dimension verticale d'occlusion est déterminée.

D. Toutes les réponses sont fausses.

I F I A
E N E
H I C

- 11- Les dents en rétention sont indiquées lorsqu'elles sont :
 A- Présence des dents antérieures, restantes fortement dévitalisées.
 B- Présence des dents antérieures restantes conformes d'une exodontie préalable.
 C- Toutes les réponses sont fausses.
 D- Toutes les réponses sont justes.
- 12- Pour Confirmer la réévaluation nécessaire sur une période de 24 mois est :
 A- Plus importante à la mandibule qu'à la maxillaire.
 B- Plus importante au maxillaire qu'à la mandibule.
 C- La même au maxillaire et à la mandibule.
 D- Quatre fois plus importante à la mandibule qu'au maxillaire.
- 13- Le soulèvement postérieur de la masquette mandibulaire au repos est de :
 A- Une extension linguale rétro-molaires trop importante.
 B- Un bord linguale sous-mylohyoïdien trop long.
 C- Un ligament pterygo-mandibulaire non tensé.
 D- Toutes les réponses sont justes.
- 14- Après Insertion des prothèses totales en bouche, il est conseillé au patient de :
 A- S'habituer à manger avec ses prothèses neuves les premiers jours.
 B- Refiner ses prothèses le soir et les mettre dans un verre d'eau.
 C- Croquer des aliments durs pour faciliter l'adaptation.
 D- De nettoyer ses prothèses après chaque repas avec une brosse dure et de l'eau savonneuse.
- 15- Lors de l'occlusion bilatéralement équilibrée on aura :
 A- Absence de contact entre les dents antérieures en occlusion centrée.
 B- En latéralité : un ou deux points de contact du côté non travaillé sont suffisants pour assurer la stabilité des prothèses.
 C- En protrusion des contacts entre les dents postérieures et antérieures.
 D- Des contacts antérieurs et postérieurs en occlusion centrée.
- 16- Les objectifs d'une occlusion en prothèse totale sont :
 A- Restaurer uniquement la fonction de mastication.
 B- Préserver les tissus de soutien.
 C- Assurer la stabilité des prothèses.
 D- Rétablir des rapports d'intercuspidation maximale.
- 17- La spécificité des articulateurs semi-adaptables type Non Arcon, réside dans :
 A- Des boules condylaires supportées par la branche supérieure.
 B- L'impossibilité de désolidariser les branches supérieures des branches inférieures.
 C- Des boules condylaires supportées par la branche inférieure.
 D- Toutes les réponses sont fausses.
- 18- Lors du transfert sur articulateur semi-adaptable le modèle maxillaire doit être situé :
 A- Par rapport au plan de référence axio-orbitaire.
 B- Par rapport au plan de référence de Camper.
 C- Par rapport au plan tangent au rebord basilaire.
 D- Toutes les réponses sont fausses.
- 19- L'occlusion bilatéralement équilibrée engrenée généralisée est retrouvée dans :
 A- Le montage de Hanau.
 B- Le montage de d'ACKERMAN.
 C- Le montage de GYSI.
 D- Le montage de Sears.
- 20- L'articulateur semi adaptable permet le réglage de :
 A- L'angle de Bennett lors du mouvement de protrusion.
 B- L'angle de Bennett lors du mouvement de latéralité.
 C- La pente condylienne lors du mouvement de protrusion.
 D- La pente condylienne lors du mouvement de latéralité.

page 2 | 2

ResiDentaire®

Plateforme de QCM Médecine Dentaire