

Corrige
type

Nom :

Prénom :

Cochez la ou les réponses justes

1. L'ulcération aphteuse :

- a) Survient rarement sur les parties kératinisées
- b) Survient uniquement sur les parties kératinisées
- c) Siège au niveau de la gencive attachée
- d) Toutes les réponses sont fausses

2. L'anémie :

- a) est la diminution de l'hémoglobine au-dessous de 13g/dl chez l'homme, de 12g/dl chez la femme
- b) est la diminution du nombre de globules rouges
- c) est dite macrocytaire quand le VGM est diminué
- d) est dite hyperchrome quand la CCMH est élevée

3. On parle de :

- a) leucopénie, lorsque le nombre total de globules blancs est supérieur à 4000/mm³
- b) pancytopénie, lorsque tous les éléments figurés du sang sont diminués
- c) thrombocytose, lorsque le nombre de thrombocytes est supérieur à 800 000/mm³
- d) thrombopathie, lorsque la qualité des plaquettes est altérée

4. Sur le plan clinique, l'aphte :

- a) A des bords mal limités.
- b) A des bords taillés à l'emporte-pièce et entourés d'un halo érythémateux.
- c) A une base endurée.
- d) A une base souple.

5. Certaines de ces pathologies peuvent donner des ulcérations aphteuses :

- a) Maladie de crohn
- b) Agranulocytose.
- c) Anémie par carence en vitamine B12
- d) Neutropénie.

6. Quelles sont les investigations radiologiques qui permettent l'étude des ATM

- a) TDM
- b) IRM
- c) Incidence de Schüller
- d) Orthopantomogramme

7. La glycémie :

- a) Une glycémie plasmatique à jeun supérieure à 1,26 g/L signe un diabète sucré
- b) L'hémoglobine glyquée est demandée pour évaluer l'équilibre glycémique
- c) Une HbA1c \leq 5 % indique un déséquilibre du diabète
- d) La glycémie post prandiale est mesurée 4heures après le repas

8. Parmi les facteurs locaux prédisposant à l'infection candidosique :

- a) Sécheresse buccale
- b) Port d'une prothèse adjointe mal entretenue
- c) Déficit immunitaire
- d) Dénutrition

9. Les candidoses buccales sont :

- a) Le résultat du passage du saprophytisme au parasitisme.
- b) Souvent concomitante à une immunodépression
- c) Font suite à une contamination hématogène
- d) Toutes les réponses sont correctes.

10. Devant une infection mycosique buccale le médecin dentiste doit s'attacher à :

- a) Identifier les facteurs prédisposants
- b) Rechercher d'autres localisations générales
- c) Se concentrer sur la prévention de ces infections
- d) Toutes les réponses sont fausses

11. La maladie de Behçet :

- a) Donne lieu à des ulcérations génitales récidivantes
- b) Donne lieu à des ulcérations buccales récidivantes
- c) Est de diagnostic clinique.
- d) Toutes les réponses sont fausses.

12. Quelles sont les radiographies qu'on peut réaliser dans le cas d'une canine incluse :

- a) Cliché rétroalvéolaire
- b) Tomodensitométrie
- c) Sialographie
- d) Mordu occlusal

13. Le bilan d'hémostase comporte :

- a) l'INR, pour les malades soumis à un traitement anticoagulant
- b) la mesure du temps de saignement pour explorer l'hémostase secondaire
- c) le taux de prothrombine (TP) qui doit être compris 30-45%
- d) TCK pour explorer le tronc commun et la voie intrinsèque de la coagulation

14. L'examen bactériologique :

- a) est un examen couramment demandé en médecine dentaire
- b) est indiqué dans les cas de lésions suppuratives qui résistent au traitement
- c) consiste en un antibiogramme qui détermine contre quelle souche un ATB donné est plus efficace
- d) consiste en un spectrogramme pour déterminer la sensibilité des bactéries aux antibiotiques

15. La syphilis secondaire est caractérisée par :

- a) L'installation de gommés ulcéro mutilants,
- b) L'apparition de la roséole cutanée, de syphilides et de plaques muqueuses,
- c) La nécrose caséuse,
- d) L'apparition de lésions végétantes hyperkératosiques

16. Une IDR positive confirme :

- a) l'exposition au tréponème pâle,
- b) l'exposition au bacille de Koch
- c) le diagnostic biologique de l'actinomycose,
- d) le diagnostic histologique de la tuberculose

17. Classer les lésions élémentaires suivantes en lésions élémentaires secondaires et en lésions élémentaires primaires :

- a) l'ulcération, b) la bulle, c) l'érosion, d) la vésicule, e) l'aphte, f) l'atrophie

Lésions élémentaires secondaires : a, c, e, f
Lésions élémentaires primaires : d, b

18. Dans la macule :

- a) L'angiome caverneux doit être écarté
- b) La muqueuse devient rouge et s'efface à la vitro pression.
- c) On retrouve un relief sans infiltration.
- d) Toutes les réponses sont justes.

19. La caséification ou nécrose caséuse caractérise :

- a) l'actinomycose,
- b) la syphilis,
- c) la tuberculose
- d) le muguet

20. Citez 04 facteurs responsables de la transformation des lésions élémentaires primaires en lésions élémentaires secondaires :

- a) *turn over rapide*
- b) *température constante* ou encore *La mastication*
- c) *les irritations* - les germes
- d) *les microtraumatismes* - La salive

20. Citez 04 facteurs responsables de la transformation des lésions élémentaires primaires en lésions élémentaires secondaires :

- a) turn over rapide
- b) température constante
- c) les brutalités
- d) les microtraumatismes

ou encore

- La mastication
- les germes
- La salive

ResiDentaire[®]

Plateforme de QCM Médecine Dentaire