

Nom.....*Corrigé*.....

Prénom.....

Cochez la ou les réponses justes. Répondez aux questions en cochant à gauche

1. Parmi les facteurs intrinsèques que vous connaissez dans l'apparition des candidoses on retient :
 - a. Hyposialie ou xérostomie, macération sous plaque (prothèse mal entretenue)
 - b. Terrain endocrinien
 - c. Cathéters intraveineux
 - d. Radiothérapie cervico faciale, chimiothérapie anticancéreuse.
2. La Glossite losangique médiane est :
 - a. Une plage érythémateuse losangique du dos de la langue en arrière du V lingual
 - b. Une plage érythémateuse losangique du ventre de la langue
 - c. Elle est résistante aux antifongiques
 - d. Une plage érythémateuse losangique du dos de la langue en avant du V lingual
3. Le traitement étiologique d'un aphte est basé sur :
 - a. La xylocaine en gel
 - b. La cautérisation avec le laser CO2
 - c. Mesures diététiques dans certains cas
 - d. Toutes les réponses sont fausses
4. Une biopsie est souvent indiquée en cas :
 - a. D'une ulcération traumatique
 - b. De persistance d'une ulcération
 - c. De persistance d'aphtes géants
 - d. Toutes les réponses sont fausses
5. Parmi les pathologies suivantes lesquelles pouvant présenter une lésion élémentaire primitive :
 - a. Carcinome épidermoïde
 - b. Érythème polymorphe.
 - c. Herpès
 - d. Chancre Tuberculeux
6. Une induration est un signe retrouvé à la palpation :
 - a. Evoque en premier lieu une lésion aphteuse
 - b. Qui exprime l'infiltration du tissu conjonctif par des cellules tumorales
 - c. Recherché systématiquement en cas de lésion ulcéreuse
 - d. Toutes les réponses sont fausses
7. Une macule se définit comme :
 - a. Résiste souvent à la vitro pression
 - b. Une tache rouge sans relief
 - c. Rappel le cas des gingivites
 - d. Hyperhémie inflammatoire de l'épithélium
8. Les clichés rétro-alvéolaires :
 - a. Précisent la localisation vestibulaire ou palatine (linguale) d'une dent incluse
 - b. Sont réalisés selon la technique de Dieck ou la technique du long cône
 - c. Apportent des renseignements sur la région périapicale
 - d. Sont nommés également clichés interproximaux
9. Les analyses de laboratoire peuvent être indiquées dans les cas suivants :
 - a. Confirmer ou infirmer le diagnostic d'une lésion de l'organe dentaire.
 - b. Établir le diagnostic histologique d'une lésion de la muqueuse buccale
 - c. Traiter les patients à risque dont les constantes doivent être contrôlées : cardiopathies...
 - d. Établir le diagnostic des maladies parodontales
10. Quelles sont les investigations radiologiques qui permettent l'étude des ATM :
 - a. Incidence de Hirtz
 - b. IRM
 - c. Incidence de Schüller
 - d. Orthopantomogramme

11. La numération des plaquettes :
- Est un examen biochimique
 - Permet d'explorer la voie extrinsèque de la coagulation
 - Permet d'explorer la voie intrinsèque de la coagulation
 - Entre 150 000 et 400 000/mm³
12. Pour explorer l'hémostase primaire on demande :
- La Numération plaquettaire.
 - le Temps de Howel
 - Le temps de saignement
 - Le Temps de cèphaline active
13. L'Augmentin est :
- Est l'association ; amoxicilline-acide clavulanique
 - Est l'association ; amoxicilline -métronidazole.
 - Est très efficace, indiquée pour toutes les infections orofaciales
 - Est un ATB à libération prolongée
14. Dans ces cas, l'antibiothérapie préventive s'impose :
- Chez les immunodéprimés
 - Chez les cardiopathes à risque syncopal ;
 - Chez les malades sous corticoïdes à long cours
 - Chez les hypertendus non équilibrés ;
15. La connaissance de la demi-vie plasmatique de chaque produit renseigne sur
- Permet de déterminer la fréquence d'administration par jour
 - La durée d'élimination du produit
 - C'est l'intervalle de temps au cours duquel le taux plasmatique du produit tombe de 50%
 - La durée d'absorption du produit
16. Un anti inflammatoire stéroïdien est prescrit :
- Pour limiter les suites post opératoires d'une intervention chirurgicale
 - Pour soulager la douleur d'une pulpite aiguë
 - En association d'une antibiothérapie massive pour les cellulites diffuses
 - Sans précaution particulière chez le diabétique type 2
17. Les anti-inflammatoire non stéroïdiens sont:
- Des antiagrégants plaquettaires
 - Des antis infectieux
 - Des antalgiques
 - Des antipyrétiques
18. Les critères de choix d'un antalgique sont selon :
- Le caractère aigu ou chronique
 - Le type du germe.
 - La durée d'action et ses effets indésirables
 - Le siège de l'inflammation.
19. Cochez la ou les réponses justes
- Les AINS peuvent être utilisés en association avec les corticoïdes
 - Les corticoïdes sont prescrits après une chirurgie osseuse importante
 - L'association de deux AINS augmente leur efficacité
 - Les AINS peuvent être prescrits pendant toute la durée de la grossesse
20. Quel antalgique peut-on prescrire pour la femme enceinte ou allaitante ?
- Tramadol
 - Paracétamol
 - Paracétamol Codéiné.
 - Paracétamol Caféiné