

Nom.....

Prénom.....

Cochez la ou les réponses justes. Répondez aux questions en cochant à gauche

1. La paralysie faciale centrale
 - a) Se caractérise par une prédominance sur le territoire facial inférieur
 - b) Est due à l'atteinte du nerf facial au-dessous de son noyau
 - c) Est associée à une dissociation automatico-volontaire
 - d) Se manifeste par le signe de Charles Bell
2. La paralysie faciale virale zostérienne est :
 - a) Due à la résurgence du VZV (virus varicelle zona) du ganglion géniculé
 - b) Une paralysie faciale centrale
 - c) Associée à une éruption cutanée vésiculaire dans la zone de Ramsay Hunt
 - d) Précédée par des douleurs orbitaires
3. Le traitement médical de la paralysie faciale fait appel :
 - a) Une antibiothérapie d'urgence
 - b) Une corticothérapie précoce et à forte dose
 - c) Traitement antiviral
 - d) Une vitaminothérapie B₁B₆
4. Devant une lipothymie, il faut :
 - a) Arrêter immédiatement tout soin et s'assurer de la liberté des voies aériennes supérieures (VAS)
 - b) Mettre le patient en position assise
 - c) Mettre le patient en décubitus dorsal, jambes surélevées
 - d) Mettre le patient en position latérale de sécurité
5. La position latérale de sécurité (PLS) :
 - a) Est un geste de premiers secours à pratiquer devant un patient conscient, qui respire
 - b) Sert à maintenir la liberté des VAS
 - c) Doit toujours être sur le côté gauche pour la femme enceinte
 - d) Permet de prévenir l'écoulement de liquides dans les poumons
6. Lors d'un soin dentaire, si le patient sans ATCD médicaux, présente une pâleur et des sueurs froides un pouls faible ainsi qu'une hypotension artérielle, il s'agit :
 - a) D'une hypoglycémie
 - b) D'un malaise vagal
 - c) D'une syncope
 - d) D'un choc anaphylactique
7. Une IDR à la tuberculine positive confirme :
 - a) L'exposition au tréponème pâle,
 - b) L'exposition au bacille de Koch (BK)
 - c) Le diagnostic biologique de l'actinomyose,
 - d) Le diagnostic histologique de la tuberculose.
8. La caséification ou nécrose caséeuse caractérise :
 - a) L'actinomyose,
 - b) La tuberculose
 - c) La syphilis,
 - d) Le muguet
9. Une gomme est :
 - a) L'expression de la syphilis secondaire,
 - b) Le résultat d'une dissémination hématogène du BK à partir d'un foyer tuberculeux préexistant
 - c) Une manifestation de la syphilis tertiaire,
 - d) Un nodule hypodermique indolore et mobile, se ramollissant, s'ulcérant et se vidant en laissant des cicatrices

ResiDentaireTM

10. Le muguet est une stomatite :
- a) Caractérisée par des lésions érosives siègeant sur un érythème diffus,
 - b) Chronique végétante hyper léucocytaires,
 - c) Granulomateuse chronique causée par l'actinomyces orali,
 - d) Aigue et diffuse caractérisée par un érythème sur lequel apparaît des plaques blanches facilement détachables à l'abaisse langue
11. Dans la névralgie trigéminalle essentielle, parmi les signes cliniques permettant le diagnostic positif on retrouve :
- a) La persistance d'un fond douloureux entre les accès avec parfois paresthésie et hypoesthésie ;
 - b) Une localisation unilatérale constante de la douleur dans le territoire carotidien
 - c) L'association de signes vasomoteurs
 - d) L'existence de la zone gâchette comme facteur déclenchant
12. Le traitement de 1^{ère} intention d'une névralgie essentielle repose sur :
- a) Les benzodiazépines
 - b) La prégabaline
 - c) L'amitriptyline
 - d) La carbamazépine
13. La diapneusie est :
- a) Une pseudotumeur bénigne hyperplasique de la gencive
 - b) Provoquée par des phénomènes de succion ou d'aspiration
 - c) De siège de préférence ; la face interne des joues.
 - d) Rencontrée chez la femme enceinte
14. Le botryomycome :
- a) Est observé chez le nouveau née
 - b) Est une réponse inflammatoire exagérée, face à un traumatisme ou suite à une extraction
 - c) Serait associée à un facteur microbien (botryomyces)
 - d) Résulte de l'accumulation de liquide dans l'espace sous gingival entourant une dent en éruption
15. Le kyste d'éruption :
- a) Est similaire au kyste péri-coronaire
 - b) Est assimilé à un hématome de l'éruption
 - c) Son traitement fait appel parfois à l'abstention
 - d) S'accompagne de lyse osseuse
16. La Marsupialisation :
- a) Est le traitement de choix des kystes épidermoïdes
 - b) Peut permettre l'éruption spontanée d'une dent immature
 - c) Nécessite une biopsie de la paroi kystique à l'occasion du premier temps opératoire.
 - d) Est le traitement de choix des kystes radiculo-dentaires
17. L'améloblastome se manifeste par une :
- a) Tumeur épithéliale avec induction du mésenchyme
 - b) Prolifération de l'épithélium odontogène au sein d'un stroma fibreux
 - c) Image radiologique évocatrice polygédrique en « bulles de savon »
 - d) Image géodique en croissant de lune est la plus évocatrice
18. Le Myxome :
- a) Est une Tumeur formé par du tissu calcifié
 - b) Est une Tumeur formé par du tissu mucoïde
 - c) Présente un fort potentiel d'infiltration et de destruction
 - d) Survient le plus souvent chez la personne âgée
19. Syndrome de Gardner associé :
- a) Des ostéomes multiples
 - b) Une polypose adénomateuse recto colique
 - c) Des fibromes abdominaux
 - d) Des cémentomes multiples
20. L'image radiologique en carafe caractérise le Kyste :
- a) Gingival de l'adulte
 - b) Radiculo-dentaire