

UNIVERSITE D'ALGER
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE CHIRURGIE DENTAIRE
SERVICE DE PATHOLOGIE BUCCO-DENTAIRE
CHU MUSTAPHA- PR.B.SAARI
1 EMD DE PATHOLOGIE BUCCO -DENTAIRE
4 ème année
Année universitaire : 2014-2015

COCHEZ LA OU LES REPONSES JUSTES :

- 1- En cas d'hémophilie, on retrouve :
 - a- TS augmenté, INR augmenté, TCA normal.
 - b- TS normal, INR normal, TCA augmenté.
 - c- TS normal, INR augmenté, TCA normal.
 - d- Toutes les réponses sont fausses

- 2- Un patient présentant une thrombopénie idiopathique, nécessitant l'extraction de la 46 :
 - a- Doit bénéficier, systématiquement, d'une transfusion sanguine au préalable.
 - b- Si le taux de plaquettes est supérieur à 50 000/ mm³, la transfusion ne s'impose pas.
 - c- L'intervention n'est possible que si le taux de plaquettes est supérieur à 100 000/mm³.
 - d- Les moyens locaux d'hémostase s'imposent dans tous les cas.

- 3- Dans les troubles de l'hémostase par anomalie vasculaire, on retrouve :
 - a- Un allongement du temps de Céphaline activé.
 - b- Un allongement du temps de saignement.
 - c- Un taux de plaquettes normal.
 - d- Toutes les réponses sont justes.

- 4- La neutropénie :
 - a- Peut être consécutive à certaines médicaments telles que la chimiothérapie antimétabolique.
 - b- Correspond à un trouble prolifératif.
 - c- Cette affection engendre un risque infectieux majeur.
 - d- Les manifestations buccales sont traduites par des ulcérations persistantes, nécrotiques et extensives.

- 5- Les précautions lors des soins dentaires chez la femme enceinte sont :
 - a- Installer la patiente en décubitus latéral droit, pour éviter l'hypotension à l'origine de malaise
 - b- Renoncer à l'emploi des vasoconstricteurs
 - c- Limiter la dose maximale de Lidocaïne à quatre carpules
 - d- Eviter la prescription d'AINS après le cinquième mois révolu.

- 6- Les médicaments prescrits autorisés pendant la grossesse sont :
 - a- L'amoxicilline
 - b- Le Tramadol
 - c- La vitamine A
 - d- Le paracétamol
 - e- L'aspirine

7- Le risque hémorragique chez le patient hémodialysé est inhérent à :

- a- L'héparinothérapie
- b- La thrombopénie
- c- L'altération de la fonction plaquettaire
- d- La nature invasive de l'acte odontologique

8- Parmi ces médicaments, cochez celle(s) qui ne nécessite(nt) pas d'ajustement dans le cas d'une IRC :

- a- Amoxicilline
- b- Augmentin
- c- Paracétamol
- d- Clindamycine

9- Quel (s) est (sont) le(s) médicament(s) contre-indiqué(s) en cas d'IRC

- a- Lidocaïne
- b- Tétracyclines
- c- Spiramycine
- d- Aspirine
- e- Ibuprofène

10- Les biphosphonates :

- a- Stabilisent la perte osseuse
- b- Préviennent les fractures pathologiques
- c- Améliorent la qualité de vie des patients par leurs effets antiseptiques
- d- Toutes les réponses sont justes

11- Les symptômes de l'ostéo-radionécrose peuvent se manifester par :

- a- Des douleurs avec des fistules cutanées ou muqueuses
- b- Une difficulté à ouvrir la bouche
- c- La présence d'un séquestre osseux
- d- Un os exposé dans la bouche avec des signes de mycoses virales

12- L'ostéite post-radique est :

- a- Une séquelle récente et majeure de l'irradiation des maxillaires
- b- Grave et extensive ou bénigne et limitée
- c- Une complication qui peut mettre en jeu le pronostic vital du patient
- d- Dominée par une récurrence tumorale de la sphère oro-faciale

13- Le diabète de type 2 est principalement du :

- a- A une absence de sécrétion d'insuline par destruction auto-immune des cellules pancréatiques
- b- A une insulino-résistance des cellules cibles
- c- Débute en général avant l'âge de 30 ans
- d- Débute en général après l'âge de 40 ans

14- Chez le patient diabétique équilibré de type 1 et 2 :

- a- L'anesthésie avec vasoconstricteur est contre-indiquée
- b- L'antibioprophylaxie est systématique
- c- Les corticoides peuvent être prescrits avec précaution
- d- L'anesthésie avec vasoconstricteur n'est pas contre-indiquée

- 15- Pendant la chimiothérapie, les gingivites ulcéreuses ou ulcéro-nécrotiques sont en relation avec :
- a- La neutropénie
 - b- La calcémie
 - c- L'hypoglycémie
 - d- Toutes les réponses sont fausses
- 16- Le traitement curatif d'une mucite installée associe :
- a- Les bains de bouche avec un antifongique
 - b- Les bains de bouche avec un antibiotique
 - c- Les bains de bouche avec un corticoïde
 - d- Toutes les réponses sont justes
- 17- Pendant la chimiothérapie, les extractions dentaires ne sont pas autorisées à cause du risque de :
- a- Douleurs post-extractionnelles
 - b- Alvéolites post-extractionnelles
 - c- Hémorragies post-extractionnelles
 - d- Toutes les réponses sont justes
- 18- Chez un patient sous Aspégic® et Plavix®, il faut demander avant l'extraction dentaire :
- a- INR
 - b- TCA
 - c- NFS et TS
 - d- Toutes les réponses sont justes *fausses*
- 19- Pour éviter le risque hémorragique chez un patient sous Sintrom®, il faut :
- a- Exiger un INR entre 4 et 5
 - b- Utiliser un anesthésique avec vasoconstricteur
 - c- Exiger un taux de plaquettes supérieur à 50 000/mm³
 - d- Prescrire une antibioprophylaxie
 - e- Toutes les réponses sont justes *fausses*
- 20- Devant un patient qui présente une IRC au stade terminal, la CAT avant un acte odontologique est la suivante :
- a- Contacter le médecin traitant
 - b- Vérifier la sérologie (VIH- HBS- VHC)
 - c- Demander un TP
 - d- Demander une NFS
 - e- Evaluer sa Tension Artérielle