

Prénom(s) :

Avec la réponse ou les réponses justes

Extraction dentaire chez la femme enceinte :

- a) est contre indiquée car les anesthésiques traversent la barrière placentaire
- b) comporte un risque d'avortement ou d'accouchement prématuré
- c) soit être effectuée à n'importe quel stade de la grossesse dans le cas d'une urgence
- d) est souhaitable au 2ème trimestre
- e) Toutes les réponses sont fausses

Prescription médicale chez la femme enceinte est guidée par :

- a) essentiellement, l'efficacité de la molécule
- b) Le stade de la gestation
- c) La concentration du passage de la molécule à travers la barrière placentaire
- d) L'effet tératogène des médicaments
- e) Toutes les réponses sont fausses

Syndrome des maxillaires peut être consécutive à un traitement par :

- a) Radiothérapie
- b) Chimiothérapie
- c) Biphosphonate
- d) Chirurgie mutilante

Un patient irradié pour une tumeur de la langue, consulte pour une extraction dentaire doit prendre :

- a) 2g d'amoxicilline 1heure avant l'extraction
- b) 1g de pivastacine 1heure avant l'extraction et poursuivre jusqu'à cicatrisation
- c) 2g d'amoxicilline à débiter 2 jours avant l'extraction et à poursuivre jusqu'à cicatrisation muqueuse.
- d) 2g / 1 d'amoxicilline pendant 10 jours
- e) Toutes les réponses sont justes

Anesthésie avec vasoconstricteur est contre indiquée chez le patient :

- a) Candidat à une radiothérapie cervico-faciale
- b) Traité par biphosphonate
- c) Irradié pour une néoplasie de l'estomac
- d) Sous chimiothérapie

Facteurs qui influencent les effets de la thérapie ciblée anticancéreuse sont :

- a) Le mode d'administration
- b) L'état de santé général
- c) Le type et la dose utilisée
- d) Le type de rayonnement
- e) Toutes les réponses sont justes

Effets toxiques aigus de la chimiothérapie sur l'organisme sont :

- a) Une thrombopénie avec un risque infectieux et hémorragique
- b) Une toxicité vésicale avec une cystite hémorragique
- c) Une alopecie et une réfrigération du cuir chevelu
- d) Une toxicité pulmonaire
- e) Une stomatite et une destruction de l'épithélium buccal

Risque hémorragique chez un patient sous chimiothérapie est :

- a) Mineur, si le nombre des plaquettes est supérieur à 120 000/mm³ (hémostase locale)
- b) Mineur, si le nombre des plaquettes est supérieur à 75 000/mm³ (hémostase locale)
- c) Modéré, si le nombre des plaquettes est égal 50 000/mm³ (hémostase locale ou une transfusion de plaquettes peut être nécessaire)
- d) Majeur, si le nombre des plaquettes est inférieur à 50 000/mm³ (transfusion de plaquettes)
- e) Majeur, si le nombre des plaquettes est inférieur à 25 000/mm³ (transfusion de plaquettes)

- b) L'élimination des foyers infectieux bucco-dentaires
- c) L'arrêt de la (TC) est obligatoire avant un acte invasif
- d) L'arrêt du traitement est obligatoire avant un acte non invasif

- 9- Un patient sous corticothérapie au long court :
- a) Nécessite systématiquement une couverture antibiotique pour tout acte
 - b) Nécessite une dose flash d'antibiotique seulement
 - c) Appartient au patient à risque infectieux risque A
 - d) Appartient au patient à risque infectieux risque B
- 10- La prise en charge des patients sous thérapeutiques ciblées (TC) nécessite :
- a) L'élimination des foyers infectieux bucco-dentaires avant l'instauration d'une (TC)
 - b) L'élimination des foyers infectieux bucco-dentaires après l'instauration d'une (TC)
 - c) L'arrêt de la (TC) est obligatoire avant un acte invasif
 - d) L'arrêt du traitement est obligatoire avant un acte non invasif
- 11- Les vasoconstricteurs sont contre indiqués chez les patients présentant :
- a) Une endocardite infectieuse
 - b) IDM récent
 - c) HTA contrôlée
 - d) Thrombophlébite
- 12- L'INR est demandé chez les patients sous :
- a) Aspégic 300 mg/j
 - b) Sintrom
 - c) Plavix
 - d) Lovenox
 - e) Toutes les réponses sont justes.
- 13- En présence d'une cellulite chez un patient diabétique :
- a) Le traitement d'urgence doit être réalisé uniquement chez le patient bien équilibré
 - b) Le traitement d'urgence doit être effectué quelque soit l'état d'équilibre du patient
 - c) L'extraction dentaire est différée jusqu'à avoir l'équilibre glycémique
 - d) L'extraction dentaire doit être réalisée avec une anesthésie sans vasoconstricteur
- 14- Les manifestations bucco-dentaires les plus fréquentes chez le patient diabétique sont :
- a) Xérostomie
 - b) Caries dentaires
 - c) Parodontopathies
 - d) Candidose buccale
- 15- L'hyperfonctionnement surrénalien :
- a) Il est représenté par le syndrome d'Addison
 - b) Il expose le patient à un risque infectieux
 - c) Les soins chirurgicaux et non chirurgicaux peuvent être envisagés sans précaution particulière
 - d) L'usage des vasoconstricteurs n'est pas contre-indiqué
- 16- Chez l'insuffisant rénal chronique :
- a) L'antibiothérapie post-extractionnelle est systématique
 - b) L'ajustement de la dose d'amoxicilline est basé sur le taux de créatinine sanguine
 - c) La molécule de choix est la spiramycine
 - d) Eviter les médicaments néphrotoxiques notamment le paracétamol
- 17- L'avulsion chez un hémodialysé nécessite :
- a) Un TP ou un INR
 - b) Un bilan sérologique
 - c) Une anesthésie locale avec vasoconstricteur
 - d) Intervenir la veille de l'hémodialyse
- 18- Un patient présentant un taux de plaquettes à 95 000/mm³, nécessite l'extraction de la 25, pour cela :
- a) Une transfusion sanguine préalable ne s'impose pas
 - b) Les moyens locaux d'hémostase sont indispensables
 - c) Une transfusion sanguine préalable est indispensable
 - d) Les moyens locaux d'hémostase sont facultatifs en cas de transfusion sanguine
- 19- Un patient présentant une hémophilie A, nécessite l'extraction de la 48 :
- a) L'anesthésie tronculaire n'est pas contre indiquée
 - b) L'anesthésie locale avec vasoconstricteur n'est pas contre indiquée
 - c) Les sutures sont facultatives en cas de substitution du facteur manquant
 - d) Toutes les réponses sont fausses
- 20- La leucémie aigüe :
- a) Est une hémopathie maligne
 - b) Est le plus souvent rencontrée chez le sujet âgé
 - c) Les manifestations buccales peuvent faire découvrir la maladie
 - d) Toutes les réponses sont justes