ResiDentaire™

Corrigé

Dr. Z. BENA... Pathologie et Chirurgie Buccale

SUJE

Faculté de Médecine
Département de Médecine dentaire
Service de pathologie bucco-dentaire du Pr Boudaoud
1ère EMD 4 ème année/ 8 Janvier 2018

Cochez la ou les réponse(s) juste(s)s :

1. **L'Hémoglobine glyquée:**
   a) Est aussi appelée hémoglobine glycosilée
   b) Est symbolisée par l'acronyme HBANC1
   c) Les valeurs normales sont comprises entre 14 % et 16 %.
   d) Reflète l'équilibre glycémique sur les 3 derniers mois

2. **Le diabète est considéré comme équilibré lorsque le patient a**
   a) Une Hémoglobine glyquée superieure à 7%.
   b) Le Glucose sérique à jeun est inférieur à 1,26 g/L
   c) Une glycémie post prandiale ≥ 1,26g/l
   d) Aucune des réponses n'est juste

3. **Quelle est la sixième complication chronique du diabète ?**

   .....les parodontites.....

4. **Les précautions vis-à-vis du risque infectieux ou du retard de cicatrisation :**
   a) Non usage de vasoconstricteurs
   b) Couverture ATB systématique
   c) Antibioprophylaxie débutée deux jours avant l'avulsion dentaire, poursuivie durant 8j
   d) Antibioprophylaxie en dose unique administrée une heure avant l'avulsion

5. **Les soins dentaires chez la femme enceinte sont :**
   a) Contre- indiqués au premier trimestre
   b) Souhaitables au deuxième trimestre
   c) Déconseillés au troisième trimestre
   d) Toutes les réponses sont fausses.

6. **L'extraction dentaire chez la femme enceinte est :**
   a) Contre-indiquée au troisième trimestre sous peine de survenue du « syndrome cave »
   b) Doit se faire sans anesthésie tronculaire pour l'extraction des molaires mandibulaires afin de minimiser le passage du produit anesthésique à travers la barrière placentaire
   c) Doit être reportée et réalisée juste après l'accouchement
   d) Toutes les réponses sont fausses

7. **Les vasoconstricteurs sont contre indiqués chez les patients atteints de :**
   a) Valvulopathie
   b) Antécédent D'IDM (infarctus du myocarde)
   c) Pontage aorto-coronarien
   d) Antécédent d'AVC

8. **Patient porteur de prothèse valvulaire cardiaque nécessite pour l'extraction de la 46 :**
   a) La prescription d'une antibioprophylaxie
   b) La prescription d'une antibiothérapie massive
   c) Le contrôle de l'INR
   d) La demande d'une NFS, TP

9. **L'anesthésie tronculaire à l'épine de spix est contre indiquée chez :**
   a) Le cardiopathe à risque infectieux et hémorragique
   b) Le cardiopathe à risque infectieux et syncopal
   c) Le cardiopathe à risque syncopal et hémorragique
   d) Toutes les réponses sont justes

10. **Parmi les complications de la radiothérapie cervico-faciale nous citons :**
    a) La xérostomie
    b) La mucite
    c) L'endocardite d'Osler
    d) L'aplasie médullaire

Corrigé

Dr. Z. BENAISSA
Pathologie
et Chirurgie Buccale

11. **Les gestes contre indiqués chez les patients irradiés sont :**
    a) Les soins endodontiques sur les pluriradiculées
    b) La chirurgie parodontale
    c) Extractions dans le champ d'irradiation
    d) La prothèse conjointe

12. **Le rôle du médecin dentiste avant la chimiothérapie anticancéreuse consiste en :**
    a) La prescription d'une fluoroprophylaxie
    b) D'éradiquer tous les foyers infectieux
    c) De refroidir les foyers infectieux latents
    d) Toutes les réponses sont fausses

13. **Patiente traitée il y a 5ans pour une tumeur du sein par chimio et radiothérapie ; actuellement sous Zometa, consulte pour une extraction dentaire, elle présente un risque :**
    a) D'ostéonécrose
    b) D'ostéoradionécrose
    c) Hémorragique
    d) Hémorragique et infectieux à cause de l'aplasie médullaire

14. **Patient traité par chimiothérapie, dont la dernière cure remonte à 20 jours, consulte pour une extraction dentaire, pour cela avant, il faut demander systématiquement :**
    a) Un INR
    b) Une NFS
    c) Une Radio panoramique
    d) Un bilan d'hémostase complet

15. **Un patient présentant un taux de plaquettes à 92 000/mm3 nécessite l'extraction de la 36,pourcela :**
    a) Une transfusion sanguine préalable n'est pas nécessaire
    b) Une transfusion sanguine préalable est indispensable
    c) Les moyens locaux d'hémostase sont indispensables
    d) Les moyens locaux d'hémostase sont facultatifs en cas de transfusion sanguine

16. **Un patient présentant une hémophile A sévère, nécessite l'extraction de la 48 :**
    a) L'anesthésie tronculaire est contre indiquée
    b) L'anesthésie avec vasoconstricteur est contre indiquée
    c) Les sutures sont facultatives en cas de substitution du facteur manquant
    d) Toutes les réponses sont fausses

17. **L'anémie de Biermer est :**
    a) Une maladie caractérisée par un déséquilibre entre la production des différentes chaines d'hémoglobine
    b) Une anémie par déficit en vitamine C
    c) Une maladie génétique liée à une anomalie de la structure de la globine
    d) Toutes les réponses sont fausses

18. **Quelles sont les complications de l'insuffisance rénale chronique ?**
    a) Hypertension artérielle
    b) Diabète
    c) Accident vasculo-cérébral
    d) Anémie

19. **Les examens biologiques demandés devant une insuffisance rénale chronique sont :**
    a) Taux de l'hémoglobine glyquée
    b) Taux de l'hémoglobine
    c) INR
    d) TP

20. **Dans l'insuffisance rénale chronique, une de ces propositions est fausse, laquelle ?**
    a) Le vasoconstricteur n'est pas contre indiqué
    b) Une anesthésie tronculaire sans vasoconstricteur est à éviter
    c) L'antibiothérapie post-extractionnelle n'est pas systématique
    d) Une contamination virale est possible

ResiDentaire™