

Cochez, la réponse juste : (Durée de l'épreuve : 30 minutes)

1. La Sialadénite tuberculeuse de la parotide se manifeste cliniquement par :
 - a) Un nodule froid de la loge glandulaire, souvent prétragien.
 - b) Des douleurs lancinantes.
 - c) De la fièvre et une altération de l'état général.
 - d) Une salive purulente au niveau de l'orifice du Wharton.
2. Les lithiases salivaires :
 - a) S'accompagnent d'une sécheresse buccale.
 - b) Se produisent le plus souvent dans la glande sublinguale.
 - c) Se produisent le plus souvent dans la glande parotide.
 - d) Sont toujours visibles sur les radiographies.
 - e) Peuvent être asymptomatiques.
3. La prise en charge des lithiases des glandes salivaires fait appel à :
 - a) Une approche chirurgicale exclusive visant à éliminer l'obstacle.
 - b) Un traitement médical permettant la fragmentation du calcul.
 - c) La lithotritie intra-canalair.
 - d) Une prescription systématique d'antibiotiques pour prévenir l'infection du parenchyme glandulaire.
4. Les adénopathies d'origine tuberculeuse :
 - a) Sont dues au Mycobacterium ulcerans.
 - b) Les ganglions sont multiples et douloureux.
 - c) L'évolution se fait toujours vers la régression spontanée.
 - d) sont diagnostiquées exclusivement par la cytoponction.
5. Parmi les pathologies suivantes, lesquelles peuvent être responsables de l'apparition de multiples adénopathies cervico-faciales ?
 - a) Une aphtose buccale.
 - b) Un lymphome non hodgkinien.
 - c) Une sub-mandibulite d'origine lithiasique.
 - d) Une cellulite d'origine dentaire.
6. Le choc anaphylactique :
 - a) Est une réaction allergique retardée.
 - b) S'accompagne toujours d'une urticaire de contact.
 - c) S'accompagne d'une hypertension artérielle.
 - d) Peut conduire au décès du malade.
7. Le diagnostic différentiel du choc anaphylactique se fait avec :
 - a) Une hypoglycémie.
 - b) Une Stomatite allergique.
 - c) Un choc toxique.
 - d) Un angio-œdème.
8. En ce qui concerne les tumeurs des glandes salivaires :
 - a) Environ 75% des tumeurs des glandes salivaires surviennent dans la glande parotide.
 - b) Environ 75% des tumeurs des glandes salivaires surviennent dans les glandes salivaires accessoires.
 - c) Les tumeurs malignes sont plus observées dans la glande parotide.
 - d) La tumeur bénigne des glandes salivaires la plus courante est un carcinome adénoïde kystique.
9. Les séquelles observées après une parotidectomie sont :
 - a) Atteinte du nerf lingual avec anesthésie de l'hémi-langue.
 - b) Paralysie faciale bilatérale.
 - c) Rougeur cutanée et sudation de la région temporo-jugale au cours de la mastication.
 - d) Hématome occasionnant l'obstruction des voies aériennes supérieures.
10. Quel est le cancer le plus fréquent des glandes salivaires ?
 - a) Carcinome épithélial-myoépithélial.
 - b) Carcinome épidermoïde.

- c) Carcinome sur adénome pléomorphe
d) Carcinome adénoïde kystique
11. Dans le mélanome malin :
- L'étiologie est l'intoxication alcool-tabagique.
 - Le taux de survie à cinq ans est de 1%.
 - L'histologie et l'analyse immuno-cytochimique confirment le diagnostic
 - L'étiopathogénie est en rapport avec une surcharge ferrique
12. Parmi les affections buccales suivantes, laquelle n'est pas considérée comme une lésion potentiellement maligne?
- Une leucoplasie inhomogène
 - Une Syphilis tertiaire
 - Une cheilite actinique
 - Une Candidose chronique
 - Une Glossite losangique médiane
13. Laquelle des lésions suivantes de la muqueuse buccale est associée à un risque accru d'une dégénérescence maligne?
- Une langue géographique
 - Leucoplasie orale
 - Kératose avec dysplasie sévère
 - Stomatite prothétique
14. Parmi les traitements suivants, quelle est l'option thérapeutique du lichen plan buccal ?
- Exérèse chirurgicale
 - Fluconazole
 - Abstention thérapeutique et suivi
 - Aciclovir
15. Parmi les signes suivants, lequel n'est pas un signe courant d'une gingivo-stomatite herpétique?
- Une sécheresse buccale
 - Vésicules intra-orales
 - Croutes labiales
 - Ulcération intra-orales
16. Laquelle des médications suivantes est utilisée pour traiter les gingivostomatites herpétiques?
- Un antibiotique à large spectre
 - Un anti inflammatoires non stéroïdiens
 - Un antifongique
 - Des Corticoïdes
 - Aciclovir
17. Laquelle des pathologies suivantes est associée aux maladies bulleuses?
- Zona
 - Pemphigus
 - Herpes
 - La gingivite desquamative
18. Laquelle des propositions suivantes est fausse?
- Un lichen plan est maladie inflammatoire d'évolution chronique
 - Dans le lichen plan le risque de transformation maligne est inexistant.
 - Les patients atteints de lupus érythémateux disséminé peuvent présenter une lésion blanche jugale
 - Le pemphigus est moins fréquent chez les enfants
 - La Maladie de Behçet peut se manifester avec une conjonctivite et une uvéite
19. Dans le cadre d'une recherche étiologique d'une aphtose buccale récurrente chez un patient, on pense que les éléments suivants peuvent être associés à l'exception d'un facteur, lequel ?
- Notion de tabagisme chronique
 - Anémie par carence martiale
 - Maladies inflammatoires chroniques intestinales
 - Certains aliments
 - VII
20. La leucoplasie orale chevelue:
- Ne survient que chez les patients porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine (VIH)
 - Affecte généralement le dos de la langue
 - est un état précancéreux
 - correspond à une réactivation du virus Epstein Barr Virus (EB)