

Carrière Hyper

B/.....

1) Les carcinomes de la cavité buccale :

- a. Sont caractérisés exclusivement par une évolution en profondeur
- b. Sont représentés surtout par des carcinomes épidermoïdes
- c. L'épithélium est le dernier élément atteint
- d. Ils n'atteignent jamais le plancher buccal
- e. La forme ulcérée n'est jamais retrouvée

2) Le dépistage d'un cancer de la cavité buccale :

- a. Permet de détecter une lésion déjà présente pour laquelle le patient consulte
- b. S'effectue chez une population à risque
- c. S'effectue chez une population apparemment saine
- d. Utilise exclusivement un examen clinique approprié
- e. Détermine seulement les lésions symptomatiques

3) Le lichen plan est une affection potentiellement maligne :

- a. Exclusivement muqueuse
- b. Marquée par des poussées d'activité entrecoupées de périodes de quiescence
- c. L'hygiène buccale est indispensable pour assurer la guérison
- d. L'exérèse chirurgicale est indispensable pour la guérison
- e. Toutes les réponses sont justes

4) La leucoplasie est une lésion potentiellement maligne :

- a. Purement clinique sans aucune spécificité histologique.
- b. En rapport avec la consommation de tabac
- c. Nécessite une surveillance clinique et histologique pendant une courte période.
- d. Dont la dysplasie épithéliale est le seul élément prédictif d'une future transformation maligne
- e. Toutes les réponses sont justes

5) La chéilite actinique est une lésion :

- a. Qui apparaît chez les fumeurs de tabac
- b. Prédisposée chez les hommes habitant le littoral
- c. Fréquente au niveau des lèvres et la face interne des joues
- d. Dont le traitement consiste en une exérèse
- e. Toutes les réponses sont justes

1

B

6) Le carcinome épidermoïde est une tumeur maligne de la cavité buccale :

- a. Il prend naissance à partir des cellules épithéliales de la muqueuse buccale
- b. Il peut prendre naissance à partir des cellules conjonctives de la muqueuse buccale
- c. Il se développe sur les muqueuses sans jamais envahir les structures osseuses sous-jacentes
- d. Il se développe sur les muqueuses mais peut envahir les structures osseuses sous-jacentes
- e. Toutes les réponses sont justes

7) Parmi les signes suivants, quel(s) est (sont) qui doit (doivent) vous interner chez un

B

- 6) Le carcinome épidermoïde est une tumeur maligne de la cavité buccale :
- a. Il prend naissance à partir des cellules épithéliales de la muqueuse buccale.
 - b. Il peut prendre naissance à partir des cellules conjonctives de la muqueuse buccale
 - c. Il se développe sur les muqueuses sans jamais envahir les structures osseuses sous-jacentes
 - d. Il se développe sur les muqueuses mais peut envahir les structures osseuses sous-jacentes
 - e. Toutes les réponses sont justes
- 7) Parmi les signes suivants, quel(s) est (sont) qui doit (doivent) vous interpellé(e) chez un patient ?
- a. Une excroissance gingivale volumineuse et douloureuse
 - b. Une adénopathie quel que soit son volume, son siège et ses caractéristiques
 - c. Une lésion avec une induration de la base
 - d. Une ulcération évoluant depuis une dizaine de jours
 - e. Toutes les réponses sont fausses
- 8) Quelles sont les caractéristiques des carcinomes de la langue ?
- a. La base de la langue est leur siège de prédilection
 - b. C'est souvent une adénopathie sous-digastrique qui permet de les diagnostiquer
 - c. Ils sont très lymphophiles
 - d. Ils respectent souvent la ligne médiane de la langue
 - e. Toutes les réponses sont justes
- 9) L'aspect térébrant (radiologique) d'un carcinome intra-osseux primitif :
- a. Est une image lacunaire d'intensité variable et mal limitée
 - b. Est une zone de raréfaction diffuse
 - c. Est une limite imprécise
 - d. Est un os basilaire en dentelle
 - e. Toutes les réponses sont justes
- 10) Le diagnostic différentiel d'un carcinome intra-osseux primitif se fait avec :
- a. Les tumeurs épithéliales bénignes
 - b. Les sarcomes des maxillaires
 - c. La maladie de Paget
 - d. L'ostéomyélite
 - e. Toutes les réponses sont justes

- 11) Le traitement chirurgical de choix d'un carcinome de la langue infiltrant est :
- a. La vermillectomie partielle
 - b. L'hémi-vermillectomie
 - c. La glosotomie partielle
 - d. L'hémi-glossectomie
 - e. La glossectomie sub-totale
- 12) Le curage cervical trouve son indication en cas d'envahissement :
- a. D'un ganglion isolé qui est supposé être le seul ganglion envahi
 - b. Du ganglion de Kuttner
 - c. Des ganglions sous-maxillaires et sous-mentaux
 - d. De la tumeur maligne dans le tissu conjonctif
 - e. D'un carcinome épidermoïde dans le tissu osseux
- 13) A la radiographie conventionnelle (radiographie panoramique), l'ostéosarcome présente :
- a. Toujours une ostéolyse avec un liséré de condensation
 - b. Toujours une ostéolyse sans liséré de condensation
 - c. Une image radio-transparente, parfois d'allure pseudokystique, mal délimitée et traversée par des fines trabéculations.
 - d. Des zones ostéo-condensantes mal définies
 - e. Toujours un aspect en verre dépoli.
- 14) Le sarcome d'Ewing :
- a. Présente une évolution lente
 - b. Présente une évolution rapide
 - c. Présente des métastases ganglionnaires
 - d. Présente des métastases pulmonaires
 - e. Présente des métastases hépatiques
- 15) En cas de suspicion de sarcome :
- a. La cytoponction n'est pas préconisée
 - b. La biopsie doit être réalisée immédiatement au cabinet dentaire
 - c. La cytoponction est préconisée
 - d. La biopsie doit être réalisée en milieu spécialisé
 - e. La biopsie est proscrite

B

16) La stratégie thérapeutique des sarcomes doit être centrée sur :

- a. Un geste chirurgical le plus large possible
- b. Une résection en monobloc 3 à 6 cm de tissu sain en périphérie de la tumeur
- c. Une résection en monobloc 2 à 3 cm de tissus sain en périphérie de la tumeur
- d. Une radiothérapie
- e. Une chimiothérapie en préopératoire pour favoriser une exérèse carcinologique satisfaisante

17) La phase de promotion du cancer est caractérisée par :

- a. L'absence totale du signal chimique
- b. La cellule échappe à la loi de l'homéostasie
- c. L'absence totale de la mortalité cellulaire
- d. La néoangiogenèse
- e. La multiplication rapide des cellules cancéreuses

18) Pendant la phase de progression du cancer :

- a. Les cellules initiées présentent de nombreuses altérations de l'ADN
- b. Les cellules initiées n'envahissent pas le tissu conjonctif
- c. Les cellules initiées ne réagissent pas à l'éloignement des vaisseaux sanguins
- d. Les cellules initiées sont très mobiles et se multiplient rapidement
- e. Les cellules initiées présentent quelques altérations de l'ADN

19) Parmi les caractéristiques phénotypiques de la cellule cancéreuse :

- a. La modification des antigènes de surface
- b. La diminution du rapport cyto-nucléaire
- c. La perte de l'inhibition de contact
- d. La dépendance par rapport aux facteurs de croissance
- e. La perte de la dépendance par rapport à l'ancrage

20) Un cancer anaplasique est constitué de :

- a. Cellules identiques aux tissus d'origine
- b. Cellules infiltrantes
- c. Cellules différentes du tissu d'origine
- d. Cellules métastatiques
- e. Cellules hétérogènes avec noyaux volumineux et nucléoles visibles