

16. D'après la classification d'ANGLE, la relation des dents est la suivante :

- A. Classe I : canine maxillaire en distocclusion par rapport à la canine inférieure.
- B. Classe II : canine maxillaire distale d'une demie (1/2) dent par rapport à la canine inférieure.
- C. Classe III : canine maxillaire en mésiocclusion par rapport à la canine inférieure.
- D. toutes les réponses sont justes.
- E. toutes les réponses sont fausses.

17. Dans la localisation des groupes supports en normocclusion :

- A. il existe deux (02) groupes de cuspides supports, un (01) à la mandibule et un (01) au maxillaire.
- B. il existe trois (03) groupes de cuspides supports, deux (02) à la mandibule et un (01) au maxillaire.
- C. il existe trois (03) groupes de cuspides supports, un (01) à la mandibule et deux (02) au maxillaire.
- D. il existe quatre (04) groupes de cuspides supports, deux (02) à la mandibule et deux (02) au maxillaire.

18. En prothèse conjointe, un ancrage :

- A. représente la partie du pont qui est scellée sur une dent adjacente.
- B. doit restaurer uniquement la forme.
- C. doit restaurer uniquement la fonction.
- D. doit restaurer uniquement l'esthétique.
- E. toutes les réponses sont fausses.

Sur dents pulpées :

- A. si la travée de *bridge* est longue il conviendra d'utiliser les ancrages à recouvrement partiel: couronne coulée, CIV ou CCM.
- B. si la travée de *bridge* n'est pas trop longue et que les dents supports sont assez volumineuses, il conviendra d'utiliser des *inlays*.
- C. si la travée de *bridge* est très courte et que les dents piliers sont très volumineuses, il conviendra d'utiliser un *onlay*.
- D. toutes les réponses sont justes.
- E. toutes les réponses sont fausses.

Le type d'ancrage corono-radiculaire d'un *bridge* :

- A. il est préférable d'utiliser un *inlay-core* avec une couronne de recouvrement total.
- B. il est préférable d'utiliser un *inlay-core* avec une couronne de recouvrement partiel.
- C. il n'est pas préférable d'utiliser une couronne *Richmond*.
- D. il est préférable d'utiliser une couronne *Richmond*.
- E. toutes les réponses sont fausses.

ResiDentaire[®]

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

11. Le système d'embolage démontable appelé Di-Lok :
- ✓ A. réalise des MPU avant la coulée de l'empreinte.
 - ✓ B. obtient d'abord un modèle monobloc meulé de façon à ce qu'il puisse être introduit dans le moule.
 - ✓ C. réalise les MPU en fracturant le socle du modèle.
 - ✓ D. permet de reconstituer l'ensemble des MPU dans le moule grâce aux dentelures gravées sur sa face interne.
 - ✓ E. toutes les réponses sont justes.
12. La résistance d'une travée de *bridge* :
- ✓ A. est proportionnelle à sa largeur.
 - ✓ B. est proportionnelle au carré de son épaisseur.
 - ✓ C. est inversement proportionnelle à sa longueur.
 - ✓ D. est donnée par la formule $R = L \cdot e^2 / l$ (avec : R = résistance, l = largeur, e = épaisseur et L = longueur).
 - ✓ E. toutes les réponses sont fausses.
13. Selon GLICKMAN l'intermédiaire (travée) de *bridge* doit répondre aux exigences suivantes :
- ✓ A. doit être esthétiquement acceptable.
 - ✓ B. doit fournir des rapports occlusaux défavorables aux dents piliers et aux dents antagonistes.
 - ✓ C. doit permettre une auto-stimulation des tissus grâce au maximum de contacts de la langue, des joues, des lèvres et des aliments.
 - ✓ D. doit rétablir l'efficacité masticatoire de la dent qu'il remplace.
 - ✓ E. toutes les réponses sont justes.
14. L'intermédiaire de *bridge* est en rapport avec des tissus différents :
- ✓ A. La face occlusale répondant à la crête.
 - ✓ B. Les faces proximales répondant respectivement aux joues et à la langue.
 - ✓ C. Les faces gingivales répondant aux dents antagonistes.
 - ✓ D. Les faces vestibulaire et linguale répondant aux moyens d'ancrage et aux dents support.
 - ✓ E. Toutes les réponses sont fausses.
15. La position de repos (R) :
- ✓ A. est une position de référence particulière à chaque individu.
 - ✓ B. tous les mouvements mandibulaires commencent de cette position.
 - ✓ C. tous les mouvements mandibulaires se terminent à cette position.
 - ✓ D. pendant cette position les dents ne sont pas en contact.
 - ✓ E. l'espace séparant les faces occlusales antagonistes, dans cette position, est appelé libre d'inocclusion.

6. La résistance mécanique d'un bridge :

- A. dépend du choix de l'alliage.
- B. dépend de l'épaisseur de la travée.
- C. dépend de l'entendu de la construction.
- D. est augmentée par le choix des alliages précieux.
- E. est augmentée par le choix des alliages non précieux.

7. Parmi ces produits lesquels sont utilisés pour la désinfection des empreintes :

- A. l'alcool.
- B. l'hypochlorite.
- C. l'hydroxyde de calcium.
- D. le glutaraldéhyde.
- E. toutes les réponses sont justes.

8. Parmi les techniques d'accès aux limites cervicales par déflexion on retrouve :

- A. les solutions chimiques.
- B. l'électro chirurgie.
- C. le curetage rotatif.
- D. la couronne provisoire.
- E. le cordonnet.

La wash technique :

- A. correspond à une prise d'empreinte en 2 temps et avec 2 matériaux de viscosité.
- B. utilise un élastomère de haute viscosité, une fois durci, rebasé par un élastomère faible viscosité.
- C. utilise en même temps deux élastomères de haute et de basse viscosité.
- D. ne nécessite pas une déflexion gingivale.
- E. toutes les réponses sont justes.

La pâte appelée EXPASYL™ :

- A. est un matériau hémostatique.
- B. est un matériau astringent.
- C. possède une action mécanique.
- D. possède une action chimique.
- E. entraîne l'éviction gingivale pour l'ouverture du sulcus.

1. Les onlays :

- A. sont indiqués en cas de fracture fermée d'un onlay.
- B. sont indiqués comme attachements en prothèse partielle.
- C. sont contre-indiqués en cas de mauvaise hygiène.
- D. sont contre-indiqués chez le bruxoman.
- E. toutes les réponses sont justes.

2. Les onlays :

- A. sont indiqués en cas de hauteur coronaire courte.
- B. sont utilisés comme pilier de bridge de longue portée.
- C. sont indiqués en cas d'hygiène insuffisante.
- D. sont des constructions à très grande résistance.
- E. toutes les réponses sont fausses.

L'onlay d'ancrage :

- A. est utilisé en cas de bridge avec appui coronaire partiel.
- B. est utilisé comme ancrage total d'un bridge.
- C. est un ancrage pour bridge de courte portée.
- D. est utilisé en cas de faible surcharge occlusale.
- E. toutes les réponses sont fausses.

bridge à simple encastrement :

- A. est appelé cantilever.
- B. est indiqué en raison des forces passives sur les dents piliers.
- C. est contre-indiqué en raison des risques de torsions sur les dents piliers.
- D. est contre-indiqué en raison des mouvements de renversement.
- E. toutes les réponses sont fausses.

bridge polygonal :

- A. peut être partiel sous forme d'arc.
- B. peut être partiel sous forme parabolique.
- C. peut être total.
- D. s'inscrit dans 2 à 3 plans de ROY.
- E. s'inscrit dans les 5 plans de ROY.

N°	Rép.
1	E
2	E
3	ACD
4	ACD
5	ABCDE
6	ABCE
7	BD
8	AD
9	AB
10	ABCD
11	BCD
12	ABC
13	ACD
14	E
15	ABCDE
16	E
17	B
18	E
19	E
20	AC

Centre

SERV

Unité

Respo

ResiDentaire[®]

Plateforme de QCM Médecine Dentaire