

Nom :

Prénom :

Salle :

Cochez LA ou LES réponses justes

1. La position d'intercuspidie maximale (PIM) :
  - a. est une position de référence dentaire
  - b. est une position de référence articulaire
  - c. peut coexister avec des condyles en relation centrée (RC)
  - d. ne peut pas coexister avec des condyles en relation centrée (RC)
  - e. peut coexister avec des condyles en intercuspidie maximale (IM)
2. La position de repos (R) :
  - a. est une position de référence particulière à chaque individu
  - b. est une position de référence commune à tous les individus
  - c. est une position de laquelle commence et se termine tous les mouvements mandibulaires
  - d. est une position pendant laquelle les dents ne sont pas en contact
  - e. est une position pendant laquelle les dents sont en contact
3. La relation centrée est une position de référence mandibulo-crânienne qui se définit par :
  - a. une composante verticale qui est la DVO
  - b. une composante verticale qui est la DVR
  - c. deux composantes horizontales
  - d. deux composantes verticales
  - e. toutes les réponses sont fausses
4. La propriété recherchée pour les matériaux de scellement est :
  - a. la viscosité élevée
  - b. l'épaisseur du film supérieure à 25 µ
  - c. le temps de travail court
  - d. le temps de prise long
  - e. toutes les réponses sont fausses
5. Les ciments minéraux à liant organique sont :
  - a. L'oxyphosphate de zinc
  - b. Les ciments verre ionomères hybrides
  - c. Les ciments résines
  - d. Les verres ionomères
  - e. L'oxyde de zinc eugenol
6. Le descellement :
  - a. ne peut pas être réalisé mécaniquement
  - b. peut être réalisé avec des vibrations ultrasoniques
  - c. peut être indiqué en cas de sur-occlusion
  - d. n'est pas indiqué en cas de complications parodontales
  - e. est indiqué en cas de perte de la supra-structure cosmétique
7. Vis à vis du parodonte, la prothèse provisoire fixée va assurer plusieurs rôles :
  - a. maintenir la gencive libre dans une position physiologique après la préparation
  - b. faciliter la cicatrisation des tissus parodontaux autour des dents non préparées
  - c. améliorer et faciliter les conditions de la préparation
  - d. anticiper sur la forme et la morphologie de la prothèse définitive
  - e. toutes les réponses sont fausses
8. L'espace biologique :
  - a. fut décrit pour la première fois par Garguilo et Winter en 1916
  - b. sa hauteur moyenne est de 2 mm
  - c. est constitué par la zone d'attache des tissus gingivaux à la surface radiculaire
  - d. toutes les réponses sont justes
  - e. toutes les réponses sont fausses
9. D'un point de vue parodontal, la meilleure localisation des limites cervicales :
  - a. est supra gingivale
  - b. juxta gingivale
  - c. intra-sulculaire
  - d. toutes les réponses sont justes
  - e. toutes les réponses sont fausses
10. Le collage en prothèse fixée peut se faire avec :
  - a. une colle sans potentiel adhésif
  - b. une colle avec potentiel adhésif
  - c. une colle auto-adhésive
  - d. un composite flow
  - e. Toutes les réponses sont fausses

11. On appelle "Table Occlusale" la surface occlusale des dents pluri-cuspides formée par :
- les versants internes des cuspides vestibulaires et palatines
  - les versants internes des cuspides vestibulaires et linguaux
  - les versants externes des cuspides vestibulaires et palatines
  - les versants externes des cuspides vestibulaires et linguaux
  - toutes les réponses sont fausses
12. Les cuspides d'apogée :
- sont les cuspides palatines supérieures et les cuspides vestibulaires inférieures
  - sont les cuspides vestibulaires supérieures et les cuspides linguaux inférieurs
  - sont appelées cuspides primaires
  - sont appelées cuspides secondaires
  - maintiennent la dimension verticale d'occlusion (DVO)
13. L'inlay est une pièce prothétique qui :
- ne reconstruit aucune cuspipe
  - reconstruit 1 cuspipe ou plus, mais pas toutes
  - reconstruit toutes les cuspides
  - est réalisée sur molaire délabrée et devitalisée en exploitant la chambre pulaire
  - toutes les réponses sont fausses
14. Les restaurations collées indirectes :
- sont particulièrement indiquées pour les pertes de substance d'origine carieuse et les lésions occlusales d'usure
  - peuvent être assemblées par l'oxyphosphate de zinc
  - peuvent être réalisées sur des dents pulpées
  - peuvent être réalisées sur des dents dépulpées
  - toutes les réponses sont justes
15. Les restaurations collées indirectes sont contre-indiquées :
- quand la limite de la carie est sous gingivale
  - quand la limite de la carie est supra gingivale
  - en présence d'une para-fonction (buxisme)
  - quand la dent est courte
  - quand l'hygiène buccale est insuffisante
16. Les céramiques cuites sur revêtement réfractaire :
- font appel à la technique de la cire perdue
  - sont des vitrocéramiques renforcées au disilicate de lithium
  - sont des vitrocéramiques renforcées à la leucite
  - sont des vitrocéramiques
  - sont des céramiques feldspathiques
17. Les céramiques In Ceram® version Zirconia® :
- sont destinées aux restaurations esthétiques sans impératif mécanique important
  - sont destinées aux restaurations esthétiques soumises à des efforts mécaniques moyens
  - sont destinées aux restaurations esthétiques soumises à des efforts mécaniques majeurs
  - sont destinées aux restaurations soumises à des forces importantes sans impératif esthétique majeur
  - toutes les réponses sont fausses
18. Les céramiques usinées :
- sont préparées manuellement sous forme de blocs
  - sont destinés à être façonnés par soustraction dans un système spécifique CFAO
  - sont les seules à mettre en forme les infrastructures par soustraction de matériau
  - sont les seules à mettre en forme les infrastructures par addition de matériau
  - toutes les réponses sont justes
19. L'extension des fichiers exportés par la plupart des logiciels de CAO dentaire (Conception Assistée par Ordinateur) est :
- .doc
  - .pdf
  - .stl
  - .tis
  - .tsl
20. Les techniques soustractives de la FAO dentaire (Fabrication Assistée par Ordinateur) :
- permettent d'usiner de la zircone pré-frittée
  - permettent d'usiner les matériaux calcinables
  - consistent en la mise en forme d'un objet par ajout de matière par empilement de couches successives
  - engendrent des pertes importantes de matériaux lors de l'usinage
  - n'engendrent pas des pertes importantes de matériaux lors de l'usinage

# ResiDentaire

Plateforme de QCM Médecine Dentaire



## Epreuve de Prothèse - 4ème année de médecine dentaire -2019/2020

Date de l'épreuve : 31/10/2020

Corrigé Type

Barême par question : 1,000000

# ResiDentaire<sup>®</sup>

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

N°	Rép.
1	AC
2	ACD
3	AC
4	E
5	BDE
6	BCE
7	AD
8	BC
9	A
10	ABC
11	AB
12	ACE
13	A
14	ACD
15	ACDE
16	DE
17	D
18	BC
19	C
20	ABD