

Nom :

Prénom :

Cochez LA ou LES réponses justes

1. Une couronne Richmond :
 - a. peut-être aussi dénommée « couronne à tenon »
 - b. est une reconstitution coronaradiculaire
 - c. est indiquée en cas d'occlusion serrée
 - d. est une restauration à deux étages
 - e. toutes les réponses sont justes
2. Un inlay core ne peut être réalisé et scellé que sur une dent traitée et stabilisée endodontiquement car :
 - a. la résection apicale ne peut pas être pratiquée chez tous les malades
 - b. son descellement est toujours accompagné de fracture radiculaire
 - c. son descellement est extrêmement difficile et fortement déconseillé
 - d. la reprise de traitement endodontique est contre-indiquée
 - e. toutes les réponses sont fausses
3. La résine calcifiable utilisée dans la technique d'empreinte directe d'urif préparation canalinaire pour un inlay :
 - a. peut-être sujette à des variations dimensionnelles
 - b. se présente sous forme de deux pâtes, base et catalyseur
 - c. nécessite l'utilisation d'un tuteur calcifiable
 - d. nécessite la coulée du modèle de travail au laboratoire
 - e. toutes les réponses sont fausses
4. La préparation d'une dent pour recevoir un inlay métallique de classe I se caractérise par :
 - a. des parois vestibulaires et linguales légèrement convergentes 6° à 8° vers la face occlusale
 - b. des parois vestibulaires et linguales légèrement divergentes 6° à 8° vers le fond de la cavité
 - c. des parois proximales non parallèles entre elles
 - d. toutes les réponses sont justes
 - e. toutes les réponses sont fausses
5. L'overlay est :
 - a. une couronne 1/8
 - b. une couronne 3/4
 - c. une endocouronne
 - d. toutes les réponses sont justes
 - e. toutes les réponses sont fausses
6. Le cône de raccordement entre le tenon et la supra structure coronaire :
 - a. permet de renforcer la résistance mécanique
 - b. permet de résister aux forces rotationnelles
 - c. est réalisé au niveau de la face mésiale de la dent
 - d. est réalisé au niveau de la face distale de la dent
 - e. toutes les réponses sont fausses
7. Le bridge de moyenne portée :
 - a. remplace les dents antérieures avec une seule dent pilier.
 - b. peut-être de forme rectiligne ou curviligne
 - c. doit comporter un seul intermédiaire
 - d. peut comporter deux intermédiaires
 - e. son infrastructure doit être en métal
- La flexion que subit la travée d'un pont :
 - a. dépend de sa longueur et non de son épaisseur
 - b. est inversement proportionnel à sa longueur
 - c. est proportionnelle à son épaisseur
 - d. dépend du module de YOUNG de l'alliage utilisé
 - e. toutes les réponses sont fausses
- L'équilibre biomécanique d'un pont dépend :
 - a. du nombre des dents à remplacer et non de leur situation
 - b. de la nature de l'alliage utilisé et de l'élément cosmétique
 - c. de la forme de l'intermédiaire et non des faces axiales des ancrages
 - d. de la morphologie occlusale de la restauration prothétique
 - e. toutes les réponses sont fausses
- Pour augmenter la résistance du bridge aux mouvements qui le descellent :
 - a. on augmente le nombre des dents piliers non alignées
 - b. on utilise des appuis supplémentaires lorsque le bridge est en forme d'une courbure prononcée
 - c. les dents piliers doivent être dans le même plan de ROY
 - d. la somme des coefficients de mastication des dents absentes doit être supérieure à la somme des piliers
 - e. toutes les réponses sont fausses

ResiDentaire™

ResiDentaireTM

- matériau hydro colloïde réversible :
 - présente une grande fluidité
 - présente une hydrophilie réduite
 - est caractérisé par une faible résistance aux contraintes
 - ne nécessite pas de traitement immédiat de l'empreinte
 - toutes les réponses sont justes
- matériaux « polyvinyl-siloxanes » :
 - sont des polyéthers
 - sont des élastomères
 - sont des silicones par réaction d'addition
 - sont des silicones par réaction de condensation
 - sont plus hydrophiles que les hydro colloïdes
- technique dite « double mélange » :
 - est une technique d'empreinte en deux temps
 - associe deux matériaux de viscosités rapprochées
 - est indiquée uniquement pour des restaurations prothétiques plurales
 - est une technique d'empreinte monophasée
 - toutes les réponses sont fausses
- pâte appelée EXPASYL® :
 - doit être associée à la technique d'éviction gingivale par curetage rotatif
 - permet la déflexion gingivale par une action mécanique
 - permet la déflexion gingivale par une action chimique
 - n'entraîne pas une action hémostatique
 - est composée de chlorure d'aluminium et de kaolin
- intermédiaire de bridge doit :
 - être en sous occlusion
 - restaurer uniquement l'esthétique
 - être toujours en contact avec la crête édentée
 - remplacer les dents absentes
 - toutes les réponses sont fausses
- morphologie des pontiques :
 - doit avoir une surface vestibulaire surdimensionnée
 - doit avoir une table occlusale sous dimensionnée
 - assure un bombé vestibulaire très marqué
 - assure l'absence de contact occlusal avec la dent antagoniste
 - toutes les réponses sont fausses
- embrasure d'un bridge :
 - est situé entre le tiers cervical et tiers occlusal des faces proximales
 - doit être hermétiquement fermée
 - doit permettre un nettoyage efficace
 - est absente au niveau des incisives
 - toutes les réponses sont justes
- intermédiaire Intra-muqueux :
 - ne permet pas de restaurer l'esthétique
 - est fixé par les crêtes résiduelles
 - est contre-indiqué dans le secteur incisif
 - est indiqué dans la région molaire mandibulaire
 - toutes les réponses sont fausses
- pontique ovoïde :
 - permet pas de dégager les embrasures
 - autorise pas une bonne hygiène
 - est indiquée principalement pour le secteur esthétique
 - établit une large surface de contact avec la crête
 - toutes les réponses sont fausses
- cas de faible hauteur coronaire sur une molaire l'ancrage le mieux indiqué est :
 - une couronne céramo-céramique monobloc
 - une couronne céramo-céramique stratifiée
 - une couronne métallique coulée
 - une couronne céramo-métallique
 - toutes les réponses sont justes

Épreuve de Prothèse - 4ème - année de médecine
-2020/2021

Date de l'épreuve : 27/02/2021

ResiDentaire™

Corrigé Type

Barème variable par question

N°	Rép.	Barème
1	AC	1
2	AC	1
3	AC	1
4	E	1
5	AB	1
6	AB	1
7	BD	1
8	D	1
9	BD	1
10	AB	1
11	AC	1
12	BC	1
13	B	1
14	BCE	1
15	D	1
16	B	1
17	C	1
18	E	1
19	E	1
20	C	1
21		0
22		0
23		0
24		0
25		0
26		0
27		0
28		0
29		0
30		0
31		0
32		0
33		0
34		0
35		0

N°	Rép.	Barème
36		0
37		0
38		0
39		0
40		0

Centre Hospitalier Universitaire de
SERVIC DE
Professeur de
Dr. 