

Les réponses justes.

1- Une prothèse composite comporte :

Une prothèse amovo-inamovible au maxillaire supérieur et / ou au maxillaire inférieur.

Une prothèse amovible reliée à une prothèse fixe au maxillaire et / ou à la mandibule naturelle.

2- Le rôle essentiel auquel doit répondre un attachement ou attache est :

La rétention.

3- Le fraisage secondaire concerne :

Les barres cingulaires.

Les barres coronaires.

4- Les attachements ou attaches à liaison rigide sont indiqués dans le cas :

Les édentements de cl III et IV .

5- Dans le cas de deux dents isolées sur l'arcade supérieure avec un rapport couronne clinique/racine défavorable, le traitement de choix est :

Attache supra radulaire ou axial.

6- L'épithèse est une prothèse maxillo-faciale (PMF) :

Exo-buccale

Gingivale

Substitut de l'organe absent ou mutilé

7- Dans le cas de pertes de substances traumatiques, la PMF est :

Indiquée pour rétablir l'esthétique et la fonction en deuxième intention.

Réalisée en complément de la chirurgie.

Nécessaire pour restaurer la fonction et la contention en utilisant des appuis dentaires.

8- les obturateurs sont utilisés :

Dans le cas d'un comblement de pertes de substances.

Communication bucco-sinusienne.

9- Dans le cas de perte de substance maxillaire, la PMP trouve son indication dans le schéma suivant :

- a- Obturateur et prothèse dentaire d'usage.
- b- Obturateur seul.
- c- Plaque obturatrice immédiate avec des crochets.

10- Dans le cas d'une DVP ou fente vélo-palatine, le traitement de choix est :

- a- Une prise en charge dès la naissance.
- b- Une PMF pour compenser la perte de substance.

11- l'empreinte préliminaire en prothèse maxillo- faciale doit objectiver :

- a- La situation des organes périphériques.
- b- L'anatomie des dents.

12- L'empreinte en prothèse maxillo-faciale :

- a- Elle concerne la perte de substance et nécessite une empreinte secondaire, soit avec des selles-grilles ou un PEI.

13- L'empreinte secondaire en prothèse maxillo-faciale :

Elle se fait aussi avec une selle grille porte- empreinte.

14- Les attachements sont des dispositifs unissant deux parties de prothèse entre elles :

- a) Avec ou sans possibilité de mouvements

15- Les attachements sont indiqués :

- a) Coronoplastie très mutilante avec exposition de la dentine

16- L'attachement axial est un attachement :

- a) Disposé sur une racine naturelle.

17- Les barres de conjonction sont des dispositifs :

- a) Visent à solidariser deux ou plusieurs éléments dentaires.

18- Les attachements rigides permettent :

- a) Mouvements d'insertion et de désinsertion de la prothèse

19- Les implants postérieurs ostéo-intégrés sous la PPAC permettent :

- a) Améliore l'efficacité masticatoire

20- La prothèse provisoire implantaire partielle :

- a) Son but est strictement esthétique

21- Face à un édentement distal bilatéral, la solution thérapeutique idéale est :

Prothèses conjointes implanto- portées sur plusieurs implants postérieurs.

ResiDentaireTM

22- La dualité tissulaire des édentements distaux est reproduite sous les

Les PPAC supra-implantaires grâce :

L'anneau espaceur de l'attachement

23- Les attachements supra-implantaires sont reliés au châssis métallique

grâce :

A une résine auto-polymérisable

24- La loi dite des trois « H » qui touche un tissu irradié est définis par une :

- a) Hypocellularité,
- b) Hypo vascularisation
- c) Hypoxie

25- La xérostomie post radique :

- a) Compromet la rétention prothétique
- b) Engendre des mycoses
- c) Perturbe les fonctions immunologiques

26- L'ostéo-radio-nécrose :

- a) Peut apparaître 3 mois après la fin de l'irradiation
- b) Une irritation prothétique peut accroître les risques de son apparition.

27- La Radiothérapie exclusive :

- a) à pour but d'éliminer les cellules tumorales
- b) Les radiomucites aiguës apparaissent à partir de la 2ème ou 3ème semaine du traitement.

28- il est recommandé de :

- a) Faire des contrôles prothétiques régulier en prévision d'une récive ou d'une complication

29-Le passage de l'édentement partiel à l'édentement total se fait avec :

- a) La prothèse de transition
- b) La prothèse à recouvrement radiculaire
- c) La prothèse immédiate

30 -la prothèse transitoire à long terme:

- a) Indiquée quand qu'il y'a peu de dents qui manques sur l'arcade.
- b) est réalisée sous forme d'un châssis métallique
- c) C'est la prothèse évolutive
- d) Toutes les réponses sont justes

ResiDentaireTM