

ResiDentaire[®]

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

1. Un attachement est un dispositif mécanique :
 - A. Qui assure la sustentation.
 - B. Qui rile la prothèse amovible à la prothèse fixée.
 - C. Constitué de deux parties mâle et femelle.
 - D. Qui assure la rétention.
2. L'attachement extra-coronaire est :
 - A. Indiqué dans les édenticements intercalés et distaux.
 - B. Un attachement axial.
 - C. A liaison articulée et rigide.
 - D. Constitué de systèmes faisant appel aux forces de friction.
3. Dans les attachements intra-coronaires :
 - A. La rétention est assurée par le système bouton-pression.
 - B. La rétention est assurée par les glissières.
 - C. La vitalité pulpaire est conservée.
 - D. La liaison est articulée.
4. Dans la réhabilitation par la prothèse partielle coulée sur implants, ces derniers assurent :
 - A. La sustentation.
 - B. La stabilisation.
 - C. L'esthétique.
 - D. La rétention.
5. Lors de la connexion de la PPAC aux implants :
 - A. Les piliers prothétiques sont vissés sur les implants.
 - B. Un anneau d'espacement est placé entre la partie mâle et femelle des systèmes d'attaches.
 - C. Les parties femelles sont enrobées dans la résine des selles.
 - D. Toutes les réponses sont justes.
6. En PPAC, les implants sont indiqués pour être le support de :
 - A. Attachement de précision supra-implantaire.
 - B. Barres de conjonction.
 - C. Couronnes fraîsées.
 - D. Toutes les réponses sont fausses.
7. La prothèse totale immédiate d'usage :
 - A. Est une prothèse qui nécessite une mise en condition.
 - B. Permet au patient de se familiariser avec le caractère amovible de la prothèse.
 - C. Est une prothèse réalisée à partir d'une empreinte préliminaire.
 - D. Toutes les réponses sont fausses.
8. La prothèse totale à visée implantaire :
 - A. Est une prothèse conventionnelle réalisée après la mise en place des implants.
 - B. Servira de guide radiographique.
 - C. Est une prothèse transitoire.
 - D. Est une prothèse définitive.
9. La prothèse composite :
 - A. Est une prothèse hybride constituée d'une partie fixée et d'une partie amovible.
 - B. Elle est à base de composite.
 - C. Nécessite toujours l'utilisation des attachements.
 - D. La dent d'appui est une couronne fraîsée.
10. La prothèse composite simple :
 - A. La partie conjointe présente des aménagements usinés.
 - B. Nécessite un moyen d'association : les attachements.
 - C. La partie amovible est un châssis métallique.
 - D. Peut être une prothèse supra-implantaire.
11. La prothèse maxillo-faciale :
 - A. Est une spécialité en prothèse dentaire.
 - B. Les endoprothèses en font partie.
 - C. Les appareils protecteurs des radiations lénissantes n'en font pas partie.
 - D. Fait son lit de fondements aux techniques de la prothèse adjointe.

12- Les pertes de substances maxillaires :

- A. Ont pour origine exclusive les lésions tumorales.
- B. Engendre à chaque fois une communication bucco-sinus-natale.
- C. La phonation est fortement perturbée
- D. La prothèse obturatrice constitue la solution prothétique.

13. La prothèse obturatrice permet :

- A. Le rétablissement des fonctions (alimentation, phonation).
- B. Evite les surinfections des voies aéro-digestives-supérieures.
- C. Guide la cicatrisation des tissus.
- D. Aide à la protection des dents résiduelles pendant la radiothérapie.

14- Les mucines salivaires

- A. Sont des glyco protéines.
- B. Participent à l'élaboration de la pellicule exogène acquise.
- C. Permettent l'adhérence microbienne.
- D. Ne jouent aucun rôle.

15- La xérostomie :

- A. Est un excès de sécrétion salivaire.
- B. Est une sécheresse buccale
- C. Est causée par la radiothérapie
- D. Est une maladie contagieuse.

16- La dosimétrie en radiothérapie :

- A. Est la dose de médicaments prescrits aux patients cancéreux.
- B. Est la détermination par une étude informatique de la dose de rayons à appliquer sur la zone à traiter.
- C. Dépend de l'âge du patient.
- D. Est facultative.

17- L'ostéo- radionécrose :

- A. Est une maladie auto immune.
- B. Survient majoritairement au maxillaire.
- C. Est caractérisée par la nécrose de l'os.
- D. Est causée par la radiothérapie.

18- Lors de la prise d'empreinte primaire en prothèse maxillo-faciale :

- A. La perte de substance doit être comblée par une compresse.
- B. Les élastomères de synthèse sont utilisés.
- C. Les hydrocolloïdes irréversibles sont utilisés.
- D. Toutes les réponses sont fausses.

19- En prothèse gériatrique, les modifications des structures locales se font au niveau :

- A- De l'organe dentaire par la résorption osseuse.
- B- De l'organe dentaire par la perte des dents et la diminution du support parodontal.
- C- Des muscles masticateurs par l'augmentation de la capacité masticatoire.
- D- Des muscles masticateurs par la diminution de la capacité masticatoire.

20- Chez le patient dépendant moteur on retrouve :

- A- Un vieillissement physiologique.
- B- Un vieillissement pathologique.
- C- Des difficultés à se déplacer mais globalement le patient est en bonne santé.
- D- Une dépendance médicamenteuse.