

Questions à choix multiples  
Questions à réponses ouvertes et courtes

NOM :

PRENOM :

Année universitaire 2017 / 2018

Coufflype

Alger, le 18 / 04 / 2018

DECRIRE LA POSITION DE TRAVAIL REQUISE FAVORABLE.

(5 lignes)

- position de midi au dessus du patient dans
  - laquelle les épaules doivent être sur une ligne
  - horizontale, la tête faiblement inclinée en avant
  - pour un axe de vision bipupillaire horizontale.
- Cette position permet aussi de laisser les bras flottants et près du corps

PAR DEFINITION, L'ERUPTION DENTAIRE :

- Est un processus dynamique correspondant à la formation des dents et à leur poussée.
- Débute dès la constitution de la lame dentaire.
- Est un processus de croissance qui implique les dents et les tissus environnants.
- N'est pas empêché par l'ablation du follicule dentaire.

DONNEZ LA DEFINITION DE L'ANASTROPHIE :

Anomalie caractérisée par un pivotement à 180°. La dent prend une position totalement inversée avec la couronne en position apicale

LA DENT NATALE EST :

- Est une dent qui fait son éruption dans les 30 jours de la naissance.
- Son extraction est de règle.
- Est fréquente au niveau du maxillaire supérieur.
- Est fréquente dans la région incisive mandibulaire.

LA CHRONOLOGIE D'ERUPTION DES DENT EST LIEE :

- Au sexe
- à l'origine ethnique
- au climat socioéconomique
- au climat chaud
- à l'hérédité.

LA CAUSE DE L'ERUPTION DENTAIRE EST LA FORMATION DE LA RACINE :

Vrai

Faux

CHEZ L'ENFANT :

- Les structures osseuses sont plus petites.
- Les structures osseuses sont plus denses.
- Les fibres nerveuses sont moins fines.
- La dose d'anesthésique est calculée selon l'âge.

POUR REALISER UNE ANESTHESIE LOCALE INDOLORE CHEZ L'ENFANT, IL FAUT :

- Chercher un contact osseux.
- Aspirer uniquement avant l'injection.
- Appliquer une pression digitale.
- Insérer l'aiguille, puis tirer sur la lèvre.

COMMENT CHOISIT-ON LA DOSE D'ANESTHESIQUE LOCAL CHEZ L'ENFANT ET QUELLE EST LA MOLECULE DE CHOIX ?

La dose d'anesthésique est exprimée en milligrammes par kilo gramme de poids corporel

- molécule de choix : Amino amides

CITEZ LES ETAPES LORS DE LA REALISATION D'UNE ANESTHESIE CHEZ UN ENFANT.

- Radiographie préopératoire

- Anesthésie de surface

- Anesthésie proprement dite

2

3

**LA MUQUEUSE BUCCALE PEUT ETRE LE SIEGE :**

- De nombreuses affections.
- D'une lésion d'origine locale.
- D'une lésion d'ordre général mais elle révèle aussi parfois des pathologies générales.
- D'une variation de coloration.

**L'EXAMEN RADIOGRAPHIQUE :**

- Est le principal examen complémentaire en odontologie.
- Est un examen systématique en odontologie Pédiatrique.
- Comporte plusieurs incidences.
- Toutes les réponses sont justes.

**LE CLICHE RETRO-ALVEOLAIRE :**

- Est effectué quand on suspecte une carie profonde.
- Est souvent réalisé avec un film radiographique pour adulte.
- Ne permet pas de visualiser la totalité de la dent.
- Offre la possibilité d'observer le degré de maturation des racines.

**LE CLICHE RETRO-CORONAIRE (BITE-WING) :**

- Permet d'obtenir une dissociation des points de contact.
- Ne permet pas d'obtenir une dissociation des points de contact.
- Permet de déceler précocement les caries proximales.
- Permet d'observer les racines des dents temporaires.

**L'ORTHOPANTOMOGRAMME :**

- Permet de visualiser la totalité des dents présentes et des germes sous-jacents.
- Le champ d'indication de prescription de cet examen est vaste.
- Le champ d'indication de prescription est limité.
- Peut servir à évaluer l'évolution d'une dent ou de plusieurs dents, si elle est réalisée de façon régulière.

3

4

**LES TECHNIQUES D'ANESTHESIE CHEZ L'ENFANT SONT REALISEES EN FONCTION:**

- de l'âge du patient
- de la qualité du tissu de soutien de la dent

**L'ANESTHESIE transcorticale:**

- Entraîne le risque de morsure de la lèvre.
- Est une approche simple lors d'une anesthésie des molaires maxillaires.
- Nécessite une rotation plus importante.
- Est indiquée dans le cas de résorption physiologique.

**LE MEOPA :**

- Entraîne un effet anesthésiant.
- Est une alternative à l'anesthésie locale.
- Permet de réaliser des soins complexes.
- Est réalisé en première intention.

**LORS D'UNE ANESTHESIE PAR SEDATION CONSCIENTE :**

- Etablir un contact verbal.
- Une anesthésie locale n'est pas nécessaire.
- L'effet sédatif est obtenu en 6 minutes.
- L'effet sédatif disparaît en 3 à 5 minutes.

**LES OBJECTIFS DE L'EXAMEN CLINIQUE SONT :**

- Déterminer l'état de santé orale.
- Identifier les anomalies et les pathologies buccodentaires.
- Identifier les pathologies maxillo-faciales.
- Situer la santé buccodentaire dans le contexte de santé générale.