Université d'ALGER
Faculté de Médecine
Département de MEDECINE DENTAIRE

Odontologie Conservatrice / Endodontie

Chef de Service Pr MEHDID - BABA
1er E.M.D 4ème Année

Nom :
Prénom :

Corrigé type

Questions à choix multiples
Questions à réponses ouvertes et courtes

~~les réponses justes sont celles coché~~

LE COIFFAGE D'UN OPERCULE DECALCIFIE :

- ☐ Se fait avec l'oxyphosphate de calcium.
- ☐ Est un coiffage pulpaire direct.
- ☐ Le curetage doit-être parfait (cri dentinaire).
- ☒ Est un coiffage pulpaire indirect.
- ☐ La restauration est réalisée à la même séance.

LES INDICATIONS MAJEURES DU COIFFAGE PULPAIRE DIRECT SONT :

- ☐ L'inflammation pulpaire totale.
- ☐ Les caries juxta pulpaires.
- ☐ Les pulpites irréversibles.
- ☐ Les caries à évolution rapide (cerne laiteux de Marmasse).
- ☒ Dans le cas d'une mise à nu de la pulpe iatrogène

LA DENTINE REACTIONNELLE :

- ☐ Survient naturellement au cours du vieillissement de la dent.
- ☐ Est appelée aussi dentine physiologique.
- ☐ Est appelée aussi dentine affectée.
- ☒ Se retrouve en regard d'un fond de cavité ayant subi un coiffage.
- ☐ Est secrétée par les fibroblastes.

LORS D'UN COIFFAGE DENTINAIRE :

- ☒ Le curetage dentinaire de toute la cavité doit être parfait.
- ☒ Le premier temps du curetage dentinaire est réalisé manuellement (excavateur).
- ☐ On laisse un opercule de dentine infiltrée.
- ☐ Le curetage dentinaire doit être parfait au niveau des parois mais pas auniveau pulpaire.
- ☐ L'anesthésie est obligatoire

QUELLES SONT LES PROPRIETES DU « BIODENTINE » ?

- ☐ Pouvoir dentinogène et antibactérien
- ☐ Assure une bonne étanchéité au niv dentin
- ☐ Il Assure l'Absence de Sensibilités post-opéra
- ☐ Il est Radio-opaque.

ResiDentaire™

TITREZ ET LEGENDEZ LE SCHEMA SUIVANT : (3pts)



.....Concept de la zone apicale = schéma de la région apicale selon "Kuttler"

CITEZ 4 VOIES DE PENETRATION BACTERIENNE A L'ORIGINE DE L'INFECTION PULPOPARODONTALE : (2PTS) :

1 - Microcouronne et fêlures
2 - Exposition pulpaire par fracture
3 - Perte d'attache épithéliale (traumatisme abrasion ... surjoyage radiculaire)
4 - Exposition dentinaire (abrasion, attrition, érosion)
5 - Micro-infiltrations bactériennes (perte d'étanchéité)
6 - caries pénétrantes
7 - poche parodontale
8 - infection par anacharèse

DONNEZ LA DEFINITION DU FAUX CANAL

- Le faux canal est une route cataogène qui peut de l'endodonte et aboutit au desmodonte

LE BOUCHON APICAL :

- [x] Survient lorsque l'irrigation canalaire est insuffisante
- [x] Est à l'origine d'un transport interne du foramen
- [x] Peut être à l'origine d'une butée apicale
- [ ] Est fréquent quand la concentration de la solution d'irrigation est faible
- [ ] Est toujours accompagné d'une déchirure apicale

TOUS CES ACCIDENTS SURVIENNENT AU COURS DE LA PREPARATION CANALAIRE ET SONT LOCALISES AU 1/3 APICAL :

2,8)

- [x] le bouchon apical
- [ ] le stripping
- [x] le faux canal
- [x] la butée
- [x] Le transport externe du canal

ResiDentaire®

LA CICATRISATION DE LA FISTULE D'ORIGINE ENDODONTIQUE SE FAIT :

- Quelques jours après le traitement endodontique.
- Plusieurs mois après le traitement endodontique.
- 2 à 3 années après le traitement endodontique.
- Après endodontie chirurgicale.
- Toutes les réponses sont fausses.

QUELS SONT LES CRITERES CLINIQUES DE CICATRISATION APICALE :

- Absence de symptomatologie
- Absence de fistule, ou de tuméfaction
- Percussion non douloureuse
- Disparition de l'image périapicale préexistante.
- diminution de l'image périapicale préexistante.

CITEZ 4 ROLES (OU PROPRIETES) DE L'HYDROXYDE DE CALCIUM FORME MAGISTRALE :

1 – poursuivre la désinfection après la mise en forme canalaire.
2 – Éviter une contamination secondaire.
3 – Induire la minéralisation.
4 – Action Antiseptique. 6 – Réduire l'acidité du milieu infecté (pH = 12)
5 – Hémostase.

LE TRAITEMENT D'URGENCE DE LA PARODONTITE APICALE AIGUE :

- Est le drainage de la collection purulente
- Un traitement antibiotique et antalgique est de règle
- La dent est laissée ouverte jusqu'à une séance ultérieure
- La dent est obturée la première séance
- La dent est mise en sous occlusion

ResiDentaire™

LA PERFORATION DU PLANCHER PULPAIRE :

- [x] Peut être obturée après l'obturation des canaux au cours de la même séance
- [x] Est obturée au MTA
- [ ] Peut être obturée au Ca (OH)2
- [x] Peut être évitée si le praticien utilise une fraise Endo Zekrya
- [x] Peut être obturée au Biodentine

LA LIME DE PERMEABILITE EST UTILISEE POUR :

- [ ] Mesurer la longueur de travail
- [ ] Explorer le canal « Le cathétérisme »
- [ ] La Préparation canalaire
- [x] Libérer le canal de toute obstruction
- [x] Vérifier la vacuité apicale après le passage de tout instrument actif

POUR LE RETRAIT D'UN INSTRUMENT FRACTURE DANS LE CANAL, LE PRATICIEN PEUT UTILISER :

- [x] La technique du ByPass
- [x] La boite de Masseran
- [x] L'IRS
- [ ] le kit PROTAPER
- [ ] Toutes les réponses sont justes

ResiDentaire™