

Nom :

Prénom :

1- Le traitement d'urgence sur une chirurgie de présentant une pulpite aigue associée à une parodontite apicale est :

- a- La pulpotomie
- b- La pulpectomie
- c- Une désinfection canalaire
- d- Un traitement coronaire plus traitement radiculaire
- e- Un appasement calmant (pulpocyl)

2- Dans le syndrome du septum :

- a- il n'y a pas de douleur
- b- Les douleurs surviennent avant les repas
- c- Le papille gingivale est d'aspect normal
- d- On note l'absence de point de contact inter dentaire
- e- Les douleurs peuvent faire penser à une atteinte dentinaire

3- Le traitement d'urgence d'une dent immature : fracture datant de quelques mois est :

- a- Une pulpotomie
- b- un coffrage pulpaire direct
- c- Une thérapeutique apico-génèse
- d- Un traitement endodontique conventionnel
- e- Une thérapeutique d'apexification

4- Lors d'une intrusion ou ingression :

- a- Le choc est le plus souvent horizontal
- b- Le choc est le plus souvent axial
- c- Le bord libre est toujours visible
- d- Le choc est le plus souvent frontal
- e- La dent est toujours fracturée

5- La fêlure :

- a- Est une fracture complète de l'émail, avec perte de substance amélaire.
- b- Est une fracture complète de l'émail et dentine.
- c- Est une fracture incomplète de l'émail et dentine.
- d- Est une fracture incomplète de l'émail sans perte de substance
- e- Toutes les réponses sont fausses.

6- La fracture coronaire avec exposition pulpaire :

- a- Est une fracture qui concerne l'émail et la dentine.
- b- Est une fracture qui concerne l'émail uniquement.
- c- Est une fracture coronaire pénétrante.
- d- Est une fracture coronaire non pénétrante.
- e- Toutes les réponses sont fausses.

7- Dans le diagnostic de la concussion :

- a- la dent ne présente aucune mobilité
- b- La dent présente un déplacement.
- c- Les tests pulpaire sont toujours négatifs.
- d- La radiographie révèle un élargissement ligamentaire.
- e- la dent ne présente aucune sensibilité ni à la mastication ni au test de percussion.

8- Le traitement d'urgence d'une fracture amélo-dentinaire avec exposition pulpaire bien étendue sur dent immature consiste à réaliser :

- a- Une contention à l'aide d'un bandeau de CVI.
- b- Un coffrage pulpaire direct
- c- Un coffrage pulpaire indirect
- d- Une restauration esthétique
- e- Une pulpotomie partielle

9- Lors d'une fracture radiculaire au niveau apical :

- a- La dent est très mobile
- b- La dent n'est pas du tout mobile.
- c- Le traitement consiste en l'extraction de la dent
- d- Le traitement consiste à faire une résection apicale
- e- Le traitement consiste en l'abstention et surveillance

10) Le traitement d'urgence d'un abcès parodontal aigu (AAA) est :

- a- Une pulpectomie sous anesthésie
- b- Une prescription d'un antalgique + antibiotique
- c- Une pulpectomie sous anesthésie
- d- Un drainage plus antibiothérapie
- e- Remplacement immédiat avec obturation provisoire

11- L'effet thermique est un facteur :

- a- Biologique
- b- Chimique
- c- Qui n'altère pas la pulpe
- d- Peut être géré par le polissage
- e- Mécanique

12- Les perforations iatrogènes :

- a- Sont causées par le praticien
- b- Peuvent servir de logement intra-radicaire
- c- Apicales se nomment stripping
- d- Du plancher se traitent par obturation canalair
- e- Toutes les réponses sont fausses

13- Les dentifrices :

- a- Sont tous à base de fluorures de sodium
- b- Leur concentration varie entre 1000 à 1500 ppm
- c- Sont utilisées par voie systémique pour la reminéralisation des lésions carieuses initiales
- d- Sont utilisés par voie topique pour la reminéralisation des lésions amélaire initiales
- e- Toutes les réponses sont fausses

14- Les gels fluorés sont :

- a- Des concentrés de fluorures dans une base de résine
- b- Très adhérents aux surfaces dentaires
- c- Utilisés à domicile à une faible concentration
- d- Indiqués à raison de deux fois par an en denture mixte si le RCI est élevé
- e- Toutes les réponses sont fausses

15- Le scellement thérapeutique :

- a- Est indiqué pour les lésions carieuses initiales des faces vestibulaires
- b- Est indiqué pour les lésions carieuses initiales des faces proximales
- c- Consiste en l'infiltration d'une résine dans les porosités de la dentine
- d- Est indiqué pour les lésions carieuses initiales des faces occlusales
- e- Utilise un concentré de fluorures

16- Les vernis fluorés :

- a- Sont utilisés à l'aide d'un porte empreinte au cabinet
- b- Sont appliqués au cabinet par le médecin dentiste
- c- Peuvent être utilisés à domicile
- d- Sont indiqués à raison de 4 fois par an chez l'enfant à RCI élevé
- e- Sont des fluorures administrés par voie systémique

17- L'infiltration résineuse :

- a- Est indiquée pour les lésions carieuses initiales des puits et sillons des faces occlusales
- b- Consiste en l'infiltration d'une résine de haute viscosité à travers les porosités de l'émail déminéralisé
- c- Permet de créer une véritable barrière de surface contre la pénétration des bactéries
- d- Est indiquée uniquement pour les dents permanentes
- e- Est indiquée pour les lésions initiales situées sur les faces lisses et proximales des dents

18- Les fractures du 1/3 apical sont toujours ouvertes :

- a- Vrai
- b- Faux

19- Le diagnostic de l'expulsion d'une dent mature exige toujours un examen radiographique.

- a- Vrai
- b- Faux

20- Parmi les causes iatrogéniques de l'atteinte septale nous retrouvons :

- a- La présence d'une couronne prothétique
- b- Une obturation débordante
- c- Une réparation de la lyse osseuse
- d- Un point de contact restauré
- e- Toutes les réponses sont fausses

15
13
12
3

X



Epreuve d'O.C.E - 4^{ème} - année de médecine dentaire -2020/2021

2^{ème} E.H.D

Date de l'épreuve : 17/05/2021

Page 1/1

Corrigé Type

ResiDentaireTM

Barème variable par question

N°	Rép.	Barème
1	B	1
2	D	1
3	E	1
4	B	1
5	D	1
6	C	1
7	A	1
8	E	1
9	E	1
10	D	1
11	D	1
12	A	1
13	D	1
14	C	1
15	D	1
16	B	1
17	E	1
18	B	1
19	A	1
20	B	1
21		0
22		0
23		0
24		0
25		0
26		0
27		0
28		0
29		0
30		0
31		0
32		0
33		0
34		0
35		0

N°	Rép.	Barème
36		0
37		0
38		0
39		0
40		0

