

ResiDentaireTM

La courbe de Wilson :

1. est une courbe antéropostérieure
2. passe par les canines
3. concerne les molaires uniquement
- ④ peut être perturbée par une interférence cuspidienne

Le système proprioceptif dentaire est situé :

- ① au niveau du ligament parodontal
2. au niveau des ATM
3. au niveau des muscles
4. au niveau de la gencive
5. toutes les réponses sont justes

La fonction groupe antérieure :

1. est assurée par les canines seulement
2. est assurée par les incisives seulement
- ③ est assurée par les incisives et les canines
4. est assurée par les canines et les prémolaires

Le métronidazole :

1. est un antibiotique bactéricide, actif sur les germes aérobies
2. est un antibiotique Bactériostatique, actif sur les germes anaérobies
3. seul, peut éliminer l'Aggregati bacter actinomycetemcomitans (A.a.)
- ④ seul, peut éliminer le Porphyromonas gingivalis (Pg)

Les intervalles entre les séances de maintenance dépendent de :

1. la nature de l'atteinte (le diagnostic)
2. la présence de facteurs de risque
3. la motivation et la coopération du patient
- ④ toutes les réponses sont justes

La chlorhexidine est :

1. l'antiseptique de référence, essentiellement indiquée dans le cadre de la prévention des maladies parodontales.
2. une des molécules de deuxième génération des antiseptiques, indiquée lors de la phase d'attaque du traitement parodontal.
3. une des molécules de troisième génération des antiseptiques ayant la capacité de retarder la reformation du biofilm.
- ④ toutes les réponses sont fausses

Le traitement parodontal additionnel lors de la maintenance consiste à :

1. intervenir chirurgicalement pour l'éradication des poches parodontales
- ② un traitement parodontal limité
3. la régénération osseuse guidée
4. toutes les réponses sont fausses

Lors du mouvement de protrusion :

- ① la désocclusion des dents cuspidées est totale
- ② toutes les incisives sont en bout à bout
3. il doit exister des contacts postérieurs
4. il y'a participation des canines

Les anti-inflammatoires les plus utilisés et étudiés dans le cadre des maladies parodontales sont :

- ① les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
2. les anti-inflammatoires stéroïdiens
- ③ ceux qui ont une action sur le métabolisme des prostaglandines.
4. toutes les réponses sont justes.

À l'interrogatoire, il est important de demander si le patient est fumeur car l'ensemble des études désigne le tabac comme :

- ① un facteur de risque majeur sur le parodonte
2. le tabagisme exerce une influence positive sur la progression des maladies parodontales
- ③ influence la guérison après traitement parodontal
4. toutes les réponses sont justes.

L'occlusion balancée :

- ① est recherchée lors des mouvements de latéralité
2. seules les molaires du côté travaillant participent au mouvement de latéralité
- ③ permet la stabilité de la prothèse amovible
4. n'assure pas une stabilisation des prothèses

Une interférence latérale non travaillante signifie un contact exagéré au niveau :

- ① des molaires
- ② des prémolaires
- ③ des canines
4. des incisives

Un point d'appui bien stable, est assuré par :

- ① l'annulaire pour éviter de déraper et de lacérer la gencive
- ② sa proximité par rapport à la zone de travail
3. l'angle d'attaque de l'instrument sur la dent
4. une position extra-orale

La mauvaise haleine et un composé sulfuré volatile produit par les bactéries à Gram négatif aérobies, non parodontopathogènes.

Vrai

Faux

Les cuspides primaires sont les cuspides linguales mandibulaires et vestibulaires maxillaires.

Vrai

Faux

Les étapes de la prévention secondaire sont :

1. Dépistage (identification précoce)
2. Interception (traitement précoce)

La maintenance professionnelle se fait en trois parties :

1. Examen et réévaluation de l'état général et le santé bucco-dentaire
2. Polissage et réinstruction
3. Programmer le patient pour un traitement additionnel ou pour la prochaine séance de maintenance