

262	LACHIB NACERA	4
264	LADJALI HADJER	13
265	LADJALI RAOUF	11
266	LAGHBECHÉ CHAÏMA	

Faculté de Médecine d'Alger

Année universitaire : 2016-2017

Département de Médecine dentaire

Service d'ODF Pr.N.Benkherfallah

Nom :

Corrige - Type

Responsables du module : Dr BENBOUDA /Dr ARAB

Prénom :

2^e EMD d'ODF 2^{ème} année (durée de l'épreuve 45 minutes)

Cochez la ou les réponses justes : (1 pt/QCM)

1- un profil cutané concave :

- est un profil dysharmonieux
- se caractérise par la rétrusion des deux lèvres par rapport à la ligne E de Ricketts
- peut se manifester par un angle naso-labial ouvert
- autorise des extractions dentaires

2-En denture permanente :

- Les dents sont implantées verticalement
- La courbe de SPEE est une courbe sagittale à convexité supérieure
- Les incisives et canines supérieures ont une inclinaison positive
- La courbe de WILSON est une courbe transversale à concavité supérieure

3-La formule dentaire suivante correspond à :

16	55	14	53	12	11	21	22	63	64	65	26
46	85	84	83	42	41	31	32	33	74	75	36

- 9 ans d'âge dentaire
- La phase de denture mixte stable
- La phase de constitution de la denture adulte jeune
- La phase de constitution de la denture adolescente

4-Lors de l'éruption dentaire, la phase d'éruption passive correspond à :

- La calcification de la couronne
- L'émergence de la couronne dans la cavité buccale
- L'édification de la racine
- Le déplacement du germe en intra-osseux

5-L'installation d'une dysmorphose de classe II est associée à :

- Une fermeture de l'angle sphénoïdal
- Un recul des cavités glénoïdes
- Une hyperflexion de la base du crâne
- Une rotation interne des maxillaires,
- Une position en arrière de la mandibule

6-La denture temporaire joue un rôle dans :

- Le maintien de la dimension verticale
- La maturation des fonctions oro-faciales
- L'établissement de l'occlusion en denture permanente
- Le maintien de l'espace pour les dents de remplacement

7-Un plan terminal à marche mésiale peut préfigurer lors de la denture permanente :

- Une occlusion de classe III d'ANGLE
- Une occlusion de classe II d'ANGLE
- Une mésioposition d'une demi-cuspide de la 1 ère molaire inférieure par rapport à son homologue supérieure
- Une rétroclusion incisive

8-L'installation d'une dysmorphose de classe III est associée à :

- Une hyperflexion de la base du crâne
- Rotation externe des maxillaires
- Position avancée des cavités glénoïdes.
- Une position en arrière de la mandibule

9-Durant la croissance :

- Le maxillaire fait une rotation antérieure
- Le maxillaire fait une rotation postérieure
- Les deux héli-maxillaires font une rotation externe
- Les deux héli-maxillaires font une rotation interne

10-la croissance du nez :

- est estimée à 3mm par an en moyenne
- a la particularité d'être tardive
- est influencée par le traitement ODF
- doit être prise en compte avant le traitement orthodontique

11-Le plan sagittal médian :

- divise la face en trois étages égaux
- est parallèle aux plans bipupillaires et bicommissurales
- est brisé au niveau du point S/Nasal dans le cas de déviation du menton
- passe par le trichion, ophryon, point sous nasal, stomion et gonion

12-La flexion de la synchondrose basi crânienne se traduit par une :

- Rotation antérieure de l'occipital
- Rotation horaire du corps du sphénoïde
- Descente et recul des apophyses ptérygoides
- Poussée en avant et en haut du vomer

13- un profil droit moyen :

- est un profil transfrontal selon Izard
- présente un pogognon cutané à mi-distance du plan Simon et du plan Dreyfus
- est un profil rectiligne selon la ligne E de Ricketts
- Présente un point sous nasal sur le plan de Dreyfus

14-l'orthopédie dento-faciale peut modifier la croissance :

- du front
- du nez
- du maxillaire supérieur
- du malaire

15-sur un visage harmonieux :

- une légère asymétrie n'est pas acceptée
- la présence du stomion n'est pas obligatoire
- l'équilibre entre les saillies et les dépressions est très important
- les valeurs céphalométriques sont idéales

16-la convexité du profil cutané :

- est importante à la naissance
- diminue avec l'âge, nez inclus
- diminue avec l'âge, nez exclu
- peut être modifiée par un traitement orthodontique

17- un sourire est dit plaisant si :

- Il est large, laissant découvrir les dents jusqu'à la 2ème prémolaire
- Il laisse apparaître des diastèmes inter dentaires
- Il laisse apparaître la gencive attachée
- Il laisse découvrir les incisives inférieures.

18-si on recule les incisives supérieures de 3mm :

- la lèvre supérieure recule de 3mm
- la lèvre supérieure recule de 2mm
- la lèvre supérieure s'épaissit de 1,5mm
- la lèvre supérieure ne s'épaissit pas

19-si on recule les incisives inférieures de 2mm :

- la lèvre inférieure recule de 2mm
- la lèvre inférieure recule de 1mm
- la lèvre supérieure recule de 1mm
- la lèvre supérieure ne recule pas

20-Le système tensionnel membraneux responsable des adaptations des pièces osseuses de la base du crane est constitué de :

- La faux du cerveau et la faux du cervelet
- La tente du cervelet,
- La tente de l'hypophyse et la tente de la gouttière optique.
- Deux systèmes tenseurs de la base du crane: un horizontal et un vertical.

Dr. K. BENBOUDA
Spécialiste en Orthopédie
Dento-Faciale