

1- l'évaluation du stade de croissance consiste à :

- a- localiser le stade de croissance sur la courbe du taux de croissance.
- b- estimer le type de croissance faciale.
- c- évaluer la quantité de croissance à venir.
- d- déterminer les facteurs influençant la croissance.

2- Lors d'une rotation postérieure de la mandibule :

- a- le condyle est orienté vers l'arrière.
- b- la croissance est horizontale.
- c- le canal dentaire est rectiligne.
- d- la branche montante est plus longue et large.

3- Les syndesmoses :

- a- séparent les os enchondraux.
- b- présentent un pouvoir adaptatif.
- d- séparent les os de la base du crâne.
- c- toutes les réponses sont fausses.

4- La suture médio-palatine :

- a- active jusqu'à l'âge d'adolescence.
- b- se synostose à 25ans.
- c- permet une action orthopédique dans le sens transversale.
- d- toutes les réponses sont justes.

5- Le sésamoïde est un os qui se forme :

- a- En regard de l'épiphyse de la 1^{ère} phalange de l'index.
- b- En regard de la diaphyse de la 2^{ème} phalange du pouce.
- c- En regard de l'épiphyse de la 2^{ème} phalange du pouce.
- d- En regard de la diaphyse de la 1^{ère} phalange du pouce.

6. Le maxillaire supérieur est un os :

- a- De substitution.
- b- Qui se forme à partir de quatre points d'ossification
- c- Qui prend naissance dans la capsule nasale.
- d- toutes les réponses sont fausses.

7- Le stomodéum :

- a- est à l'origine d'une partie de l'œsophage
- b- est à l'origine de la cavité buccale
- c- est à l'origine des ailes du nez
- d- est à l'origine des fosses nasales

8- la fusion des deux bourgeons palatins :

- a- permet la fermeture du palais primaire
- b- permet la fermeture du palais secondaire
- c- permet la séparation de la cavité buccale et des cavités nasales
- d- nécessite la disparition de l'épithélium de recouvrement des bourgeons

9- le crane cartilagineux :

- a- est aussi désigné sous le terme de chondrocrane
- b- est à l'origine de la voûte crânienne
- c- provient uniquement des cellules des crêtes neurales céphaliques
- d- est aussi désigné sous le terme de desmocrane

10-le palais primaire

- a- a pour origine les bourgeons maxillaires
- b- a pour origine le palais secondaire
- c- a pour origine le bourgeon nasofrontal
- d- se situe dans la partie antérieure du palais

9

11-lors de la croissance, les sutures de la voûte du crâne sont :

- a-membraneuses
- b-mésenchymateuses
- c-ossifiées
- d-cartilagineuses

9

12-parmi ces cartilages lequel (lesquels) est (sont) un (des) cartilage(s) secondaire(s) de la mandibule :

- a-le cartilage de Meckel
- b-le cartilage coronoté
- c-le cartilage de Reichert
- d-le cartilage condylien

9

13-lors de la mise en place du visage :

- a-le bourgeon naso-frontal forme l'aile, le dos et la pointe du nez, une partie de la lèvre supérieure et de la joue
- b-les bourgeons nasaux latéraux forment l'aile du nez
- c-la lèvre supérieure est formée par la confluence entre les extrémités des bourgeons maxillaire et le processus intermaxillaire
- d-les bourgeons nasaux latéraux fusionnent avec les bourgeons maxillaires pour former la pointe du nez

14-la formation de la cavité buccale

- a-début au premier mois du développement embryonnaire
- b-la cavité buccale est limitée uniquement par les bourgeons maxillaires au niveau de son plafond
- c-les bourgeons mandibulaires forment le plancher de la cavité buccale
- d-la fusion des bourgeons maxillaire et nasaux externes limite l'ouverture de la cavité buccale

?

15- la cinquième semaine du développement la face est représenté par :

a-3 bourgeons : un frontonasal, unmaxillaire, un mandibulaire

b-2bourgeons : un frontonasal est le premier arc pharyngé

c-5bourgeons : un frontonasal, deuxmaxillaires, deux mandibulaires

d-5bourgeons : deuxmaxillaires, deuxmandibulaire, ledeuxième arc pharyngé

16. La mésodermsation est-elle ?

a-Une absence de mort cellulaire.

b-Une mort cellulaire.

c-Une fusion entre deux membranes épiblastiques.

d-Une confluence des bourgeons faciaux.

17- parmi ces sutures les quelles sont responsables de la croissance transversale de la base du crane :

a- la suture sphéno-occipitale

b- la suture fronto-ethmoidale

c- la suture intra occipitale postérieure

d- la suture intra occipitale antérieure

18- la croissance mandibulaire est :

a- remodelante

b- cartilagineuse

c- périosté

d- suturale

19- le massif facial supérieur :

a- est composé de 13 os pair et le vomer

b- est composé de 14 os

c- le comet inférieur fait partie de ce massif facial supérieur

d- toutes les réponses sont justes



Examen d'ODF 2ème Année Médecine dentaire du 04/04/2016

Nom: C O R R I G E T Y P E

Prénom: O D F

Salle/Place: /
Matricule: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / Date de naissance: 0 1 / 0 1 / 1 9

Ce sujet contient 20 QCM

A B C D

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

A B C D

- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.