

Ce ci est un Q.C. M ; cocher les réponses justes.

1/La suture mediopalatine comporte les sutures :

a- inermaxillaire et maxillo-malaire.

b- intermaxillaire et interpalatine.

c- itermaxillaire—et maxillopalatine

d- iterpalatine et maxillopalatine.

2/la croissance mandibulaire poste natale se fait grâce :

a-à la syndesmose symphysaire

b-à une croissance condylienne.

c-Au cartilage de MECKEL

d-au remodelage (apposition/resorption)

3/ Au moment de pic pubertaire augmente

a-Taux et rythme

b-Rythme

c-Taux de croissance.

d-Le taux enregistré et le plus important

4/ Dans l'ossification membraneuse, l'os se forme

a-Indirectement a partir du blastème mésenchymateux

b-Dans une zone limitée, appelée centre primaire d'ossification par substitution

c-Directement a partir du blastème mésenchymateux.

d-A partir d'une maquette cartilagineuse préalablement formée

5/ La pièce osseuse peut augmenter ses dimension de deux manière

a-Croissance suturale et remodelage.

b-Croissance suturale plus interstitielle

c-Croissance suturale et déplacement de la pièce osseuse

d-Croissance par apposition et par résorption

6/ L'estimation du stade de croissance tient compte de

a-L'âge civil

b-L'âge dentaire

c-L'âge osseux

d-De la chronologie d'éruption

7/les signes d'une rotation postérieure son :

a-Un condyle dirigé verticalement, un col épais et une branche mandante étroite et courte.

b- Un condyle dirigé verticalement, un col épais et un canal dentaire rectiligne.

c-un canal dentaire courbé, un angle inter-incisif augmenté et un étage inferieur diminué.

d-un condyle dirigé en arrière, un col fin et un canal dentaire rectiligne.

8/ Pendant les premières années de la vie c'est :

a-La croissance suturale qui porte sur la croissance remodelante.

b-La croissance remodelante qui porte sur la croissance suturale

c- la croissance condylienne qui est la plus importante

d-La croissance des arcades dento-alveolaires qui est la plus importante

9/ La croissance de la face est

a-Prédéterminée ne peut être influence

b-Gouvernée par des facteurs génétiques est peut être modifié

c-Selon MOSS la matrice s'accroît pour s'adapter au déplacement de l'os

d-Modifiable par l'effort physique.

10/ Chez le nouveau né nous distinguons six fontanelles

a-Une bregmatique,une lambdatique,deux pétriqes et deux astériques

b- Une pétriqes,une astérique,deux bregmatiques et deux lambdatiques

c- Une bregmatique, une pétriue, deux lambdatiques et deux astériques

d- Deux sur la médiane et deux de chaque cote sur la voule du crane

11/ La croissance suturale de la base du crâne en largeur est dû a

a- La syndesmose métopique, la synchondrose séparant petites et grandes ailes du sphenoïde

et à la synchondrose intra occipitale antérieure

b- La synchondrose métopique, la synchondrose séparant petites et grandes ailes du sphenoïde et a la synchondrose intra occipitale antérieure

c- La synchondrose ethmoïde, la synchondrose séparant petites et grandes ailes du sphenoïde et a la synchondrose intra occipitale antérieure

d- des sutures disposées longitudinalement.

12/ Si la base du crâne est allongée l'occlusion est de type :

a- classe III. b- classell. c- classe I. d- la mandibule est portée en arrière.

13/ le sésamoïde apparait :

a- en moyenne 12 mois avant le pic de croissance.

b- en moyenne 12 mois après le pic de croissance.

c- 9 mois avant le pic chez les garçons et une année chez les filles.

d- 9 mois avant le pic chez les filles et une année chez les garçons.

14/ une croissance de 5 à 6 cm par an correspond :

a- Au maximum pubertaire. b- Au minimum pubertaire

c- à la moyenne pubertaire d- a un taux très important de la croissance staturale.

15/ le plan terminal à marche distale aboutit souvent :

a- à une classe I d'ANGLE. b- à une classe II d'ANGLE.

c- a une classe III d'ANGLE. d- à une classe II de BALLARD.

16/ La ligne S de STEINER joint :

a- l a pointe du nez et le point le plus saillant du menton.

b- le pogonion cutané au milieu nasal.

c- la pointe du nez et le porion.

d- le pogonion au milieu nasal.

17/ la precision, la symétrie et la coordination des des parties sont les bases del'esthétique

a- pour JULIEN PHILIPPE b- pour ARISTOTE. c- pour HEGEL. d- pour STEINER.

18/ L a microdontie se traduit sur le plan clinique par :

a- des diastèmes. b- des dents trop petites /a l'arcade qui les porte.

c- un chevauchement. d- une déviation des médianes.

19/ Quand les dents sont grise dysplasiques elles sont souvent :

a- reculées et ingressées. b- reculées et egressées.

c- avancées pour supporté la lèvre. d- egressées.

20/ le maxillaire se forme a partir de :

a- 4 points d'ossification ,2 point A pré-maxillaire et 2 point B poste maxillaire.

b- 4 points d'ossification ,2 point A poste-maxillaire et 2 point B pré- maxillaire.

c- 2 point d'ossification, un point A poste-maxillaire et un point B pré- maxillaire.

d- 2 point d'ossification, un point A pré-maxillaire et un point B post- maxillaire.

Bonne courage

ResiDentaire™