

2005. 2006

Cochez la (ou les) réponse(s) juste(s)

1- L'indice de Pont permet:

- le diagnostic dans le sens sagittal.
- d'étudier les arcades alvéolaires dans le sens transversal.
- de comparer la largeur de base au diamètre bizygomatique osseux.

2- Dans une mésioposition molaire:

- la flèche d'arcade est diminuée.
- le point incisif est vestibulé.
- la longueur d'arcade est augmentée.
- la molaire est disto-versée.

3- Une DDM par défaut:

- se manifeste par la présence de diastèmes.
- s'associe uniquement à la CL II d'Angle.
- est dite également DDM par macrodontie relative.
- présente une place disponible supérieure à la place nécessaire.

définition de la dysharmonie dento-maxillaire.

l'infraclusie se traduit par:

- un recouvrement excessif.
- l'absence de recouvrement.
- une béance antérieure.
- toutes les réponses sont justes.

La croissance normale tend à rendre le profil:

- concave.

rectiligne.

- convexe.

droit.

L'analyse de Tweed permet:

- une étude des structures osseuses dans le sens horizontal.
- une étude des structures osseuses dans le sens transversal.
- une étude des structures alvéolaires.
- une étude des structures dentaires.

La téléradiographie permet le diagnostic:

- des bases squelettiques dans le sens horizontal.
- des bases osseuses dans le sens antéro-postérieur.
- des structures dento-alvéolaires.
- des structures cutanées.

L'analyse de l'angle facial permet:

- l'étude du profil facial.

11-pour mesurer le périmètre d'arcade, il faut:

- tenir compte de l'arc incisif
- utiliser l'indice de PONT
- mesurer les diamètres mésio-distaux des dix dents antérieures
- ✗utiliser un fil de laiton

12-le plan facial passe par les points suivants:

- nasion-gnathion
- nasion-menton
- gonion-menton
- ✗toutes les réponses sont fausses

13-l'analyse de DOWNS permet:

- l'étude de la position des maxillaires dans le sens vertical
- l'étude des rapports des maxillaires entre eux
- l'étude des rapports des maxillaires par rapport à la base du crane
- toutes les réponses sont fausses

14-l'occlusion au niveau des dents intermédiaires se fait:

- les dents supérieures sont mésialées d'une $\frac{1}{2}$ cuspide / aux dents inférieures
- les dents inférieures sont distalées d'une $\frac{1}{2}$ cuspide /aux dents supérieures
- les dents inférieures sont mésialées d'une cuspide /aux dents supérieures

15-dans une brachgnathie :

- la largeur de base maxillaire est diminuée
- la distance point A -tubérosités est courte
- l'indice d'IZARD augmente
- l'indice arcade-face est normal

16-bout à bout canin est:

- une tendance à la CLII canine
- une mésioclusion de la canine inférieure
- une distoclusion de la canine supérieure

17-quels sont les signes de la DDM:

18-définition du point prosthion

19-l'analyse de WITTS JACOBSON:

- permet l'étude du décalage des bases squelettiques
- si sa valeur est inférieure à 1mm on a une CLIII squelettique
- si sa valeur est supérieure à 1mm on a une CLII squelettique
- toutes les réponses sont fausses

20-le plan de FRANCFORT est un :

- plan osseux seulement
- passe par le tragus postérieurement et le point nasion
- passe par le porion et le point sous orbitaire