Cocher la ou les réponses justes :

1. **Le mouvement de propulsion :**
   - Est un trajet la mandibule depuis la position de repos jusqu' au bout à bout incisif
   - Dépend de la pente incisive.
   - Est guidé par les faces palatines des incisives inférieures
   - X Est guidé par les faces palatines des canines supérieures

2. **L'occlusion:**
   - Est une fonction dento-mandibulaire de l'appareil masticateur
   - X Amène les dents mandibulaires au contact des dents maxillaires.
   - Ne présente aucune pathologie décelable en denture temporaire
   - Exprime les rapports des dents avec le système masticateur

3. **La classification d'Angle :**
   - Est une classification exclusivement dentaire.
   - Décrit les rapports des canines et des molaires dans les sens transversal et sagittal
   - Décrit les mouvements mandibulaires en propulsion et latéralité
   - X Décrit les rapports maxillo- mandibulaires dans le sens sagittal.

4. **La polydontie se caractérise par :**
   - L'agénésie de 6 dents.
   - Une agénésie totale des dents permanentes.
   - Gigantisme dentaire.
   - X La présence de dents surnuméraires.

5. **Le diastème de BOGUE nous oriente sur :**
   - X Une D.D.M par microdontie relative.
   - Une D.D.M par macrodontie relative.
   - X Une agénésie des incisives latérales.
   - Sur la présence d'une dent surnuméraire.

6. **La présence d'un odontolide peut être à l'origine d'une :**
   - X Inclusion des incisives.
   - Inclusion des canines
   - X Eruption dentaire retardée.
   - Agénésie des incisives latérales.

7. **La persistance d'une dent de lait sur l'arcade nous oriente sur:**
   - X Un retard d'éruption.
   - X Agénésie dentaire.
   - D.D.M future par microdontie relative.
   - Ankylose dentaire

8. **Le signe du QUINTERO :**
   - se caractérise par une disto version des incisives latérales.
   - se caractérise par une mesio version des incisives latérales.
   - X se caractérise par une mesio version des canines.
   - X c'est le signe d'une inclusion dentaire.

9. **L'endoalvéolie supérieure symétrique avec linguoclusion unilatérale se manifeste par :**
   - X Une symétrie mandibulaire objectivée sur téléradiographie axiale
   - X Une occlusion croisée en denture temporaire
   - X Une linguoclusion unilatérale du cote de la déviation
   - Un menton en normoposition en ICM

ResiDentaire®

10. **L'endoalvéolie supérieure asymétrique :**
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

11. **L'endoalvéolie supérieure symétrique avec linguoclusion bilatérale:**
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

12. **Si la béance est squelettique :**
- Les fonctions oro-faciales sont correctes
- La respiration peut être buccale
- L'étiologie est strictement primaire
- L'évolution est favorable

13. **Parmi les anomalies associées à l'infraclusie, on peut citer :**
- La classe II/2
- La classe II/1 face courte
- La classe II/1 face longue
- La classe III avec une rotation postérieure

14. **L'hyperactivité des muscles élévateurs est en faveur :**
- De la supraclusie
- De l'infraclusie
- De la rotation antérieure
- De la béance antérieure

15. **Les facteurs étiologiques en faveur de la béance antérieure sont :**
- Les dysfonctions linguales
- La DDD par excès maxillaire
- Une cause primaire
- Un décalage des bases osseuses de classe II ou de classe III

16. **- Les parafonctions :**
- Font partie des dysfonctions.
- Participent au déséquilibre fonctionnel.
- Peuvent traduire une immaturité psycho-affective.
- Présentent une origine génétique

17. **Les principaux facteurs tératogènes au niveau crânio-facial sont:**
- L'alcool.
- La scoliose.
- Les radiations.
- L'hyperthermie.

18. **Les anomalies alvéolaires du sens sagittal :**
- Sont caractérisées par une inclinaison atypique des procès alvéolaires latéraux.
- Peuvent avoir une origine génétique.
- Sont le résultat d'un déséquilibre musculaire.
- Peuvent accompagner un décalage des bases osseuses.

19. **Le diagnostic différentiel d'une proalvéolie inferieure doit se faire avec :**
- Une prognathie mandibulaire.
- Une infra-alvéolie supérieure .
- Une retrognathie maxillaire.
- Une infra-alvéolie inférieure.

20. **Dans le cas d'une proalvéolie inférieure, on peut retrouver :**
- Un angle i/m >98.
- Une macroglossie.
- Une procheilie supérieure.
- Des diastèmes inter-incisifs.

ResiDentaire™