

Cochez la ou les réponses justes :

- ✓ 1- L'endogonathie supérieure est :
- A- Une anomalie morphologique du vers transversal
 - B- Une anomalie basale du vers transversal +
 - C- Typiquement associée à une anomalie sagittale
 - D- Caractérisée par une inclinaison vestibulaire des secteurs latéraux +
- ✓ 2- La détermination de l'origine des anomalies en D.O.F. :
- A- Permet d'établir le diagnostic étiologique
 - B- Permet de décider de la prise en charge ou non du patient
 - C- Est parfois un élément tranchant dans le diagnostic différentiel
 - D- Est un élément décisif pour établir le pronostic
- 3- Les anomalies dentaires :
- A- Ont toute une origine commune +
 - B- Ont une origine multifactorielle
 - C- La D.O.M. due au remodelage des maxillaires est dite tertiaire -
 - D- L'agénésie dentaire peut être d'origine secondaire +
- 4- L'endoalvéolie inférieure :
- A- Est très fréquente +
 - B- Se caractérise par une vestibulo version des secteurs latéraux +
 - C- Présente un préjudice fonctionnel important
 - D- Est souvent associée à une supraocclusion incisive sévère
- 5- La dysharmonie dentaire transitoire :
- A- S'observe au moment de l'évolution des incisives latérales permanentes
 - B- S'observe au moment de l'évolution des canines
 - C- S'observe au moment de l'évolution des 1ères prémolaires
 - D- Est due à une différence dimensionnelle entre les dents lactéales et les dents permanentes
- 6- Le calcul de l'espace disponible selon Tweed se fait :
- A- Entre la face distale de la 1ère molaire inférieure et le bord antérieur de la branche montante
 - B- Entre la face mesiale de la 1ère molaire inférieure et le bord antérieur de la branche montante
 - C- le long de la ligne de morsure
 - D- Au milieu du plan d'occlusion
- ✓ 7- En cas de biretroalvéolie :
- A- le recouvrement incisif augmente
 - B- Le surplomb est normal
 - C- Des diastèmes incisifs sont visibles
 - D- Un encombrement est souvent présent
- 8- La méthode de Clark permet :
- A- D'évaluer le risque de résorption radiculaire
 - B- De situer la dent incluse dans le plan frontal
 - C- De déterminer la situation vestibulaire de la dent incluse
 - D- De déterminer la situation linguale de la dent incluse
- 9- L'inclusion dentaire est due à :
- A- La réduction des dimensions des arcades
 - B- Une brachygnathie
 - C- Une macrodontie
 - D- La présence des dents de Hutchinson
- 10- Le cône beam permet :
- A- Le contrôle de la croissance
 - B- L'évaluation des voies aériennes supérieures
 - C- La localisation de la dent incluse
 - D- D'avoir la possibilité de faire des reconstitutions en 3D

11- Folgueuse :

- A-est l'absence totale des dents ✓
- B- fait partie de l'occlusion temporaire
- C- est une anomalie en dent
- D- touche les dents de la denture

12- dans la denture :

- A- est une dent manquante
- B- concerne l'occlusion dentaire supérieure
- C- concerne l'occlusion dentaire inférieure
- D- est une anomalie morphologique

13- le tubercule de Balth :

- A- est une anomalie coronaire
- B- s'observe sur le face postérieure de la série molaire permanente
- C- s'observe sur le face postéro vestibulaire de la série molaire permanente
- D- s'observe sur le face postéro vestibulaire de la série molaire temporaire

14- Une proéminence inférieure est aggravée en cas de :

- A- amygdales hypertrophiées
- B- De frein lingual court
- C- De rotation antérieure
- D- De rotation postérieure

15- l'occlusion statique en denture temporaire se caractérise par :

- A- une courbe de spee à concavité supérieure
- B- une courbe de spee plate
- C- un recouvrement incisif de 2mm
- D- une occlusion incisive en bout à bout

✓ 16- Le plan terminal à marche mésiale préfigure une :

- A- occlusion de classe III molaire
- B- Occlusion de classe I molaire
- C- Occlusion de classe II molaire
- D- Occlusion de bout à bout molaire

17- La béance latérale :

- A- Se caractérise par une absence de contact total de l'arcade en intercuspidie maximale ✓
- B- Est très fréquente et causée par une interposition linguale ✓
- C- S'accompagne souvent d'un proglissement latéral
- D- Se caractérise par une insuffisance de la hauteur alvéolaire molaire et pré-molaire

18- La fusion dentaire est caractérisée par :

- A- une large couronne bifide
- B- Un nombre de dents inférieur au nombre de dents habituel
- C- Un nombre de dents supérieur au nombre de dents habituel
- D- La présence d'une chambre pulpaire

✓ 19- l'endoalvéolie symétrique avec linguoocclusion bilatérale se caractérise par :-

- A- Une laterodéviations
- B- Des signes cliniques semblables à une endognathie maxillaire
- C- Une occlusion croisée bilatérale
- D- Une coïncidence des milieux inter-incisifs en RC et ICM

20- Dans l'occlusion de classe II division 2 on retrouve une :

- A- Vestibulo version des incisives avec une classe II molaire
- B- Vestibulo version des incisives centrales et linguo version des incisives latérales
- C- Linguo version des incisives centrales et vestibulo version des incisives latérales
- D- Linguo version des incisives avec classe I molaire ✗