Faculté de médecine
Département de médecine dentaire
Service d'orthopédie dento-faciale CHU Mustapha
1ère EMD 3ème année 2020-2021
Responsables du module : Pr Zoubiri Dr Belhadi
Cochez la ou les réponses justes :

1-Le plan d'occlusion est matérialisé sur la TLR de profil par une ligne passant :
-Par l'engrènement molaire et le bord libre de l'incisive maxillaire.
-Par l'engrènement molaire et le bord libre de l'incisive mandibulaire.
-Par l'engrènement molaire et le milieu du recouvrement incisif.
-Par l'engrènement molaire et prémolaire.

2-Dans le sens antéro-postérieur un maxillaire court est désigné par :
-Une rétrognathie maxillaire.
-Une endognathie maxillaire.
-Une brackygnathie maxillaire.
-Une infragnathie maxillaire.

3-Une mésio-vestibulo-rotation axiale de la 11 signifie que :
-La face mésiale est déplacée en vestibulaire.
-La face distale est sur la courbe d'arcade.
-L'axe de rotation de la dent c'est la face mésiale.
-L'axe de rotation de la dent c'est la face distale.

4- Une infra-position de la canine supérieure signifie :
-Que la canine se situe au dessus de la ligne d'arcade.
-Que la canine se situe au dessous de la ligne d'arcade.
-Que la canine se situe en dedans de la ligne d'arcade.
-Que la dent se situe en dehors de la ligne d'arcade.

5-Le point gonion :
-Est un point situé dans la région de l'angle mandibulaire.
-c'est le point le plus inferieur de l'angle mandibulaire.
-C'est la bissectrice de l'angle formé par la tangente des deux branches de la mandibule.
-Joint au point séllion S forme l'axe Y.

6- Un angle ANB augmenté signifie :
-Un décalage des bases osseuses en faveur d'un maxillaire en avant.
-Un décalage des bases osseuses en faveur d'une mandibule en arrière.
-Un décalage des bases osseuses en faveur d'un maxillaire en avant et/ou d'une mandibule en arrière.
-Un décalage des bases osseuses en faveur d'un maxillaire en arrière et/ou d'une mandibule en avant.

7-L'étage inférieur de la face :
-Se situe entre le point A et le point Menton (Me).
-Se situe entre ENA et menton.
-Est à prendre en considération lors de la décision thérapeutique.
-Présente une proportion de 45,5+2%

8-Dans l'étude du profil selon Ricketts:
-La ligne de référence passe par le point Nasion et le Pogonion cutané.
-Le type de profil dépend de la position des lèvres.
-Le type de profil dépend de la position du menton et du nez.
-Le type de profil dépend du type du stade de dentition.

9-La photographie de profil :
-Permet de détecter une asymétrie de la forme mandibulaire.
-Permet d'apprécier l'angle naso-labial.
-Peut montrer une brièveté de la lèvre supérieure.
-Peut montrer une progénie.

10-Le panoramique dentaire :

ResiDentaire™

Permet d'apprécier le type de rotation mandibulaire.
Permet d'évaluer la hauteur de l'os alvéolaire.
Permet d'analyser les dystopies dentaires.
ermet d'apprécier la symétrie mandibulaire.

L'examen des moulages :

ermet d'analyser les angles masticatoires de Planas.
ermet de détecter un décalage entre la RC et l'ICM.
ermet de faire une évaluation chiffrée de la DDM.
ermet de déterminer la formule dentaire et l'âge dentaire.

Dans l'analyse de Bouvet des rapports molaires :

n angle (α) diminué signifie une molaire inférieure mésio-versée.
n angle (α) augmenté signifie une molaire supérieure mésio-versée.
Un angle (β) augmenté signifie une molaire supérieure mésio-versée.
Un angle (β) diminué signifie une molaire inferieure disto-versée.

13-L'examen clinique en ODF :

Permet de décrire l'occlusion dynamique.
ermet d'évaluer la formule dentaire sur radiographie panoramique
Permet d'examiner les fonctions.
Est toujours complété par des examens complémentaires.

14-L'examen du chemin de fermeture :

Se fait sur moulage
Se fait depuis la position de repos à la position d'ICM.
Se fait depuis la position d'ICM jusqu'à la RC
Permet de diagnostiquer une latérodéviation mandibulaire.

15-Lorsque l'axe y est inférieur à 56° :

La croissance mandibulaire est à tendance moyenne.
-L'étage inférieur de la face est augmenté.
-La croissance faciale est à tendance horizontale.
-Le profil cutané est convexe.

16- le plan de Francfort est :

Une ligne horizontale reliant le porion et le point sous orbitaire.
-Représenté par la ligne reliant le tragus et le point sous orbitaire.
-Le plan de référence utilisé pour l'étude de la croissance mandibulaire.
-Utilisé pour bien positionner le céphalostat.

17- la téléradiographie de profil :

Est un cliché standard tridimensionnel.
Permet l'analyse des structures basales dans le sens transversal et vertical.
Permet l'analyse des structures osseuses dans le sens sagittal et vertical.
Doit être reproductible.

18-Les structures qui sont indispensables lors d'un tracé céphalométrique sont :

Le sphénoïde.
L'orbite.
Le voile du palais.
e sinus maxillaire.

9- l'angle FMA de Tweed :

st formé par le plan mandibulaire et le plan d'occlusion.
ermet l'étude de la position verticale de la mandibule par rapport à la base du crâne.
ermet l'étude de la croissance et le type de rotation mandibulaire.
t augmenté en cas de croissance horizontale.

L'angle SNA :

ermet l'étude de la position sagittale et verticale du maxillaire par rapport à la base du crâne.
ermet d'évaluer le profil osseux du patient.
ermet l'étude de la position sagittale du maxillaire par rapport à la base du crâne.
valeur peut être négative.

ResiDentaire™

UNIVERSITE D'ALGER 1

FACULTE DE MEDECINE

Epreuve d'O.D.F - 3éme - année de médecine dentaire -2020/2021

Date de l'épreuve : 06/02/2021

Corrigé Type

Barème variable par question

N°	Rép.	Barème
1	C	1
2	C	1
3	A	1
4	A	1
5	AC	1
6	ABC	1
7	BC	1
8	BC	1
9	BCD	1
10	BD	1
11	CD	1
12	BD	1
13	ACD	1
14	BD	1
15	C	1
16	CD	1
17	CD	1
18	AB	1
19	BC	1
20	C	1
21		0
22		0
23		0
24		0
25		0
26		0
27		0
28		0
29		0
30		0
31		0
32		0
33		0
34		0
35		0

N°	Rép.	Barème
36		0
37		0
38		0
39		0
40		0

ResiDentaire®