

Cocher la ou les réponses justes

1-le syndrome de Crouzon :

- Est une crano sténose
- Peut présenter des signes craniens
- Peut présenter des signes faciaux et dentaires
- Est aussi appelé la dysostose crano faciale ?

2-la récidive peut être due à :

- Une mauvaise finition du traitement orthodontique
- Une persistance des facteurs étiologiques
- Un développement post orthodontique des D.D.S
- Une instabilité occlusale après traitement

3-le meulage sélectif permet :

- De réduire le décalage entre RCet ICM
- De supprimer des contacts prématuress
- D'éliminer toutes les interférences cuspidiennes
- De façonnner la morphologie dentaire dans le sens vestibulo lingual

4-le syndrome de Robin peut présenter :

- Une retroalvéolie supérieure
- Une rétrognathie mandibulaire
- Une endognathie supérieure
- Une infraalvéolie molaire

5-les fentes labio palatines provoquent :

- Une classe III squelettique
- Une classe II/Isquelettique
- Une endognathie
- Une atrésie du maxillaire

6-le traitement orthodontique des fentes labio palatines consiste à :

- Faire de l'expansion transversale
- Utiliser un propulseur pour le décalage sagittal
- Placer un masque de Delairt
- Placer une plaque avec verin ouvert que l'on ferme progressivement

7-la méthode de Shore consiste à :

- Faire le meulage directement en bouche
- Enregistrer les prématuress avec du papier bleu et rouge
- Pratiquer un meulage des pointes cuspidiennes
- Pratiquer un meulage léger des pentes cuspidiennes

8-La vélo plastie permet de :

- Rétablissement la phonation
- Replacer les bases osseuses en bonne position
- Rétablissement la sangle musculaire
- Rétablissement la déglutition

9-L'orthèse permet :

- ✓ D'obtenir une meilleure position des fragments maxillaires
- ✓ D'obtenir une meilleure alimentation
- ✗ D'éviter les troubles de la croissance
- ✗ D'obtenir une expansion dans le sens transversal

10-parmi les récidives les plus fréquentes, on retrouve :

- L'inclusion dentaire
- La rotation dentaire
- ★ La supra clusie incisive
- L'endoalvéolie supérieure

11-les fentes palatines sont provoquées par une :

- ✗ Absence de fusion des bourgeons faciaux (palatin de moelle)
- ✗ Absence de migration des processus palatins
- ✗ Absence de différenciation des cellules crestales
- ✗ Une anomalie embryonnaire

12-le syndrome de Cauhépe-l'ieuex est caractérisé par :

- Une endoalvéolie inférieure
- Une rétrognathie mandibulaire
- Une linguocclusion bilatérale
- ✓ Une latérodéviation fonctionnelle

13-parmi les critères auxquels doit obéir la fin du traitement orthodontique, on retrouve :

- ✗ La disparition de l'étiologie
- ✗ Une convergence des racines au niveau des sites d'extraction
- Des relations de classe II molaire
- ✗ Un chemin de fermeture droit

14-le syndrome du succur type est caractérisé par :

- Une supraclusie
- ✓ Une proalvéolie supérieure
- Une endoalvéolie inférieure
- ✓ Une légère rétrognathie mandibulaire

15-Citez la chronologie des interventions dans la méthode dite du palais précoce

16-Citez les 4 principes de la contention en O.D.F

17-Citez 4 types de dispositifs de contention

18-Définition de la contention

19-Citez les différentes techniques d'équilibration occlusale post orthodontique

20-Citez les étapes du traitement orthopédique des fentes labio palatines

