

nom : YOUSSEF YOUSSEF  
numéro : 123456789  
date : 10/10/2020

état : ✓

- 1. Le stade de la Orthopédie orthodontique :**
  - ✓ La mesure des masséters
  - ✓ La quantité de croissance
  - ✓ La direction de croissance
  - ✓ La nécessité d'extraction
- 2. Les appareillages orthodontiques :**
  - ✓ Nécessitent un port essentiellement nocturne
  - ✓ Sont utilisés uniquement en denture mixte
  - ✓ Agissent sur les incisives causant des effets dentici-alvéolaires
  - ✓ Ont pour but la correction d'un décalage squelettique
- 3. Les traitements orthopédiques :**
  - ✓ Sont souvent accompagnés d'un traitement biologique fonctionnel
  - ✓ Ne sont pas suivis d'un traitement orthodontique
  - ✓ Sont toujours suivis d'un traitement chirurgical
  - ✓ Utilisent des forces légères

- La génioplastie :**
- Est une chirurgie du nez
  - ✗ Est une chirurgie du menton
  - ✗ Peut corriger une asymétrie du menton
  - ✗ Peut être associée aux ostéotomies

- Le blocage par traction intermaxillaire :**
- Est réalisé avant la chirurgie orthognathique
  - ✗ Est réalisé après la chirurgie orthognathique
  - ✗ Fait partie de la contention post chirurgicale
  - Pérennise l'intercuspidation maximale obtenue

- l'équilibration occlusale permet :**
- D'améliorer la stabilité des résultats
  - D'empêcher la récurrence dans tous les cas
  - De faire coïncider l'ICM et la RC
  - D'éviter les extractions

**est possible de parfaire l'occlusion :**

- Grâce aux arcs de nivellement
- En utilisant des arcs idéaux
- Par la pose d'une plaque de contention
- Par le recours au tooth positioner

**Suppression des prématurités par meulage :**

- est préférable par la méthode de l'ajout
- est fait essentiellement par meulage sélectif direct
- peut-être réalisée en premier sur moulages
- est indiquée surtout chez l'adulte

**Technique Edgewise :**

- l'utilisation du fil de section ronde se fait dans le 3<sup>ème</sup> temps du traitement
- le 2<sup>ème</sup> molaire n'est jamais baguée
- l'épaisseur du bracket est de .022x.028 inch
- le bracket rectangulaire s'insère dans la lumière du bracket par son côté

10. Le nivellement en technique edgewise :
- Permet la mise à plat de l'arcade
  - Nécessite l'utilisation d'un fil de section rectangulaire
  - + Constitue le début du traitement fixe multi attachés
  - Utilise des fils comportant des courbures du 3<sup>ème</sup> ordre
11. L'arc de base de Ricketts :
- Exerce une action importante sur les prémolaires
  - + Est confectionné avec de l'Eigloy
  - + Présente une variante d'expansion avec des boucles internes
  - Permet d'ingresser les incisives grâce à un tip back postérieur
12. La technique d'arc droit utilise :
- Des fils super élastiques à mémoire de forme
  - + Des brackets pré informés
  - Des arcs utilisés comportant des courbures des trois ordres
  - + Des brackets comportant toutes les informations nécessaires aux déplacements de
13. En technique linguale incognito :
- + Les brackets sont anatomiques et individualisés
  - + l'utilisation du TARG est indispensable
  - + Les gouttières de transfert sont utilisées pour le collage
  - + Les arcs sont façonnés par le praticien
14. L'IRM en orthodontie permet de :
- + Visualiser le disque inter-articulaire
  - Visualiser la position du ménisque
  - Dépister les lésions infectieuses
  - Préciser le niveau osseux
15. L'orthodontie pré-chirurgicale permet la :
- + Correction de l'encombrement
  - + Coordination des arcades
  - Simulation des résultats de l'intervention
  - Réalisation des finitions occlusales
16. Les mini-vis :
- + Permettent de limiter les mouvements parasites
  - Permettent de réaliser des mouvements dentaires asymétriques
  - + Sont utilisées comme ancrage direct
  - + Sont indiquées dans le cas d'un support parodontal suffisant
17. La plaque de Hawley :
- + Permet le maintien de l'expansion transversale supérieure
  - Permet le maintien de la correction des rotations
  - + Permet le maintien de la correction de la classe II
  - Peut-être évidée au niveau palatin
18. Les positionneurs :
- X Sont réalisés selon les rapports d'arcades optimaux
  - Agissent comme des dispositifs actifs
  - + Agissent comme des dispositifs de contention
  - + Stabilisent la correction des rotations dentaires
19. La grille métallique d'Ellman :
- Est indiquée dans le cas d'un parodonte affaibli
  - + Est indiquée dans le cas de mobilités dentaires
  - Peut-être réalisée en méthode directe ou indirecte
  - + Permet d'intégrer une dent prothétique
20. La contention naturelle est indiquée après :
- X Correction d'une linguo-clusion antérieure
  - X Correction de la largeur inter canine
  - X Mise en place d'une dent incluse
  - X Pose d'une prothèse après un déplacement dent