

Cochez la ou les réponses justes :

1/ L'examen clinique en orthodontie :

- A- Débute par l'examen exo buccal
- B- Constitue la première étape de la démarche diagnostic
- C- Est complété par l'étude des examens complémentaires
- D- Permet de poser un diagnostic individuel et personnalisé

2/ Le diagnostic positif :

- A- Est également appelé diagnostic morphologique
- B- Comprend uniquement le diagnostic osseux et alvéolaire
- C- Donne une description complète et précise de toutes les anomalies
- D- Est basé uniquement sur la description de la classe squelettique

3/ Parmi les objectifs fonctionnels d'un traitement orthodontique, on retrouve :

- A- La correction de la classe II squelettique
- B- La suppression des para fonctions
- C- La correction de la proalvéolie supérieure
- D- La rééducation de la déglutition

4/ En fin de traitement orthodontique

- A- L'occlusion molaire correspond toujours à la classe I squelettique
- B- La contention est de règle
- C- La classe II canine est acceptable
- D- La mastication est unilatérale alternée

5/ Dans les objectifs de traitement, on retrouve :

- A- Une respiration buccale
- B- Une mastication bilatérale alternée
- C- Un sourire harmonieux
- D- Un profil rectiligne

6/ L'arc vestibulaire actif :

- A- Est réalisé avec du fil 0.6 mm
- B- Permet un déplacement palatin des incisives en translation
- C- Permet un déplacement palatin des incisives en version
- D- Est activé par ouverture des boucles de compensation

7/ Le crochet Adams :

- A- Ne peut être réalisé que sur les premières molaires définitives
- B- Doit être activé avant la livraison de l'appareillage
- C- Assure la rétention de l'appareil amovible
- D- Nécessite pour sa réalisation une hauteur coronaire suffisante

8/ Dans une plaque de contention :

- A- L'arc incisif est réalisé avec du fil 0.7 mm
- B- La résine est en contact avec les faces palatines ou linguales des incisives
- C- L'appareil permet un mouvement de linguo version ou de palato version des incisives
- D- L'appareil doit être activé toutes les trois semaines

9/ La myothérapie en ODF

- A- Est réalisée avant le traitement afin d'éviter l'aggravation des anomalies orthodontiques
- B- Doit être interrompue une fois que les résultats sont acquis
- C- N'est possible qu'avant l'âge de 8 ou 9 ans
- D- Doit être poursuivie toute la vie

10 / La rééducation de la déglutition :

- A- Est indiquée en présence d'interposition linguale
- B- Est possible à tout âge avant ou après le traitement orthodontique
- C- Doit se faire avant l'âge de 10 ans
- D- Se fait par une logette linguale

11 / Le lip Bumper :

- A- Est un appareillage fonctionnel fixe
- B- Peut être associé à une thérapeutique fixe multiattacho
- C- Potentialise la pression de la lèvre sur les incisives inférieures
- D- Assure le blocage des molaires

12 / En présence d'une agénésie d'une incisive latérale supérieure, le traitement :

- A- Consiste en la fermeture de l'espace d'agénésie
- B- Nécessite une prise en charge pluridisciplinaire
- C- Est purement orthodontique
- D- Nécessite de préférence la mise en place d'une prothèse implantaire

13 / En présence d'agénésie de deux incisives latérales supérieures :

- A- La conservation de l'espace est conseillée pour l'enfant
- B- La fermeture de l'espace est préconisée en présence d'un décalage de classe III
- C- La prothèse implantaire est préférable chez l'adulte
- D- Le remplacement des incisives latérales permet d'obtenir des rapports de classe II canine

14 / Le traitement de l'agénésie de la deuxième prémolaire inférieure :

- A- Dépend de la présence de DDM ou bien de l'absence de DDM
- B- Nécessite une intervention précoce
- C- Nécessite parfois l'extraction de 3 prémolaires
- D- Doit être purement orthodontique

15 / En présence d'une DDM de - 5mm à l'arcade supérieure en denture mixte le traitement consiste :

- A- En une expansion de l'arcade avec disjoncteur
- B- En une expansion avec quad'helix
- C- En l'utilisation d'une plaque palatine avec vérin
- D- En l'extraction des prémolaires

16 / En présence d'une DDM par microdentie :

- A- On s'abstient de toute thérapeutique
- B- On ferme les diastèmes puis prothèses de remplacement
- C- On ferme les diastèmes par mésialisation de toutes les dents
- D- On ferme les diastèmes par distalisation de toutes les dents

17 / En présence d'une DDD le traitement consiste :

- A- En l'abstention thérapeutique
- B- En l'extraction des premières prémolaires
- C- Au meulage sélectif des dents concernées
- D- Au stripping des dents concernées

18 / En présence d'une canine incluse le traitement consiste :

- A- En l'extraction de la canine temporaire
- B- En l'extraction de la première prémolaire
- C- A attendre la fin de la croissance pour intervenir
- D- En l'extraction de la canine si son axe est vertical

19 / En présence d'une incisive centrale incluse : le traitement :

- A- Débute par une thérapeutique chirurgicale
- B- Consiste en l'extraction d'un odontome
- C- Débute par un traitement orthodontique post chirurgical
- D- Consiste en l'extraction de l'incisive si son axe est horizontal

20 / En présence d'une DDM par macrodentie avec inclusion de la deuxième prémolaire :

- A- On extrait la dent incluse
- B- On procède à la désinclusion
- C- On extrait la première prémolaire pour laisser évoluer la dent incluse
- D- On s'abstient de toute thérapeutique en attendant la fin de la croissance

