

# Cochez la ou les réponses justes

le diagnostic différentiel de l'agénésie dentaire se fait avec :

- a- l'inclusion dentaire.
- b- le retard d'éruption.
- c- la transplantation.
- d- la gémation.

La rétroalveolie inférieure peut être corrigée avec :

- a- un arc lingual passif.
- b- un lip bumper.
- c- un arc de base de rétraction.
- d- une plaque lingual munie d'un poussoir.

- le traitement chirurgical exclusif de l'inclusion des canines correspond à :

- a- la transplantation.
- b- l'ostéotomie directionnelle.
- c- l'alvéolectomie conductrice.
- d- la distraction osseuse.

1- un patient âgé de 09 ans se présente à la consultation ODF; l'examen clinique révèle biproalveolie associée à une déglutition atypique. Quel est votre première approche thérapeutique ?

- a- rétablir le guidage antérieur.
- b- déverrouiller la mandibule.
- c- rééducation fonctionnelle.
- d- rattraper le décalage osseux.

- Lors de la correction de l'endognathie maxillaire on utilise :

- a- L'appareil de Chabre.
- b- Un Quad hélix.
- c- Un Disjoncteur.
- d- Un Bi hélix.

6- Une patiente de 09 ans se présente en ODF avec une béance fonctionnelle et une inocclusion labiale. A quoi pensez-vous ?

- a- A un traitement fixe seul.
- b- A une rééducation fonctionnelle.
- c- A des extractions dentaires.
- d- A une FEB antéropostérieure à traction cervicale.

Quel type d'anomalie peut-on rencontrer dans le sens vertical:

- a- Un proglissement fonctionnel.
- b- Une supraclusion antérieure.
- c- Une Latérogathie mandibulaire.
- d- Un articulé inversé antérieur.

Le traitement de la DDM positive s'effectue grâce à :

- a- L'augmentation de l'espace disponible.
- b- l'augmentation de l'espace nécessaire.
- c- La diminution du périmètre d'arcade.
- d- toutes les réponses sont fausses.

Dans le cadre de la prise en charge thérapeutique de la DDM, Le stripping est indiqué

- a- des encombrements incisifs légers.
- b- DDM prévisible supérieure à - 8mm.
- c- un profil très convexe
- d- Direction de croissance postérieure

10- Un patiente de 09 ans se présente à la consultation d'ODF. L'examen clinique révèle un squelette par retrognathie mandibulaire associée à une face courte. Quel est votre choix thérapeutique ? :

- a- ELN.
- b- Un Activateur d'Andressen.
- c- Un Disjoncteur.
- d- Une FEB à traction antéropostérieure sur gouttières.

Bonne ch

**ResiDentaire**<sup>®</sup>

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

Q1/la fronde occipito mentonnière à traction haute est indiquée :

- a) Dans les cas de classe III avec prognathisme inférieur.
- b) Dans les cas de proalvéolie inférieure.
- c) Dans les cas de biproalvéolie.
- d) Toutes les réponses sont justes.

Q2 /En fin de traitement ODF ,nous devons obtenir :

- a) Un décalage de 3mm entre la RC et ICM .
- b) Un parallélisme des axes dentaires.
- c) Des relations statiques de classe III.
- d) Des crêtes proximales au même niveau.

Q3 /les critères occlusaux de fin traitement en ODF sont une occlusion :

- a) En classe I molaire.
- b) En classe III molaire.
- c) En classe I canine.
- d) En classe III canine.

Q4 /une FEB sur bagues permet :

- a) D'ingresser une molaire.
- b) D'égresser une incisive.
- c) De corriger une rotation axiale de la canine.
- d) De distaler une molaire.

Q5 /l'équilibration occlusale est systématique :

- a) A la fin du traitement orthodontique.
- b) Lorsqu'il persiste des contacts prématurés du côté travaillant lors de la  
coïncidence entre la RC et l'ICM.
- c) Lorsqu'il persiste des prématurés du côté non travaillant.
- d) Lorsqu'il y a un décalage entre la RC et l'ICM.

16/le meulage sélectif post orthodontique :

- a) Doit être systématique en fin de traitement
- b) Doit tenir compte des différentes positions mandibulaires.
- c) Peut être envisagés après la contention.
- d) Est contre indiqué en l'absence d'extraction.

17/la contention :

- a) Doit être immédiate.
- b) Est toujours fixe.
- c) Empêche toujours la récidence.
- d) Est la phase terminale d'un traitement.

18/les dispositifs de contentions fixes sont :

- a) Gouttières thermoformées.
- b) Les attelles métalliques préfabriquées.
- c) Le toothpositionner.
- d) les butées cingulaires.

19/Le masque faciale (masque de delaire) :

- a) est utilisé dans la classe III avec Endognathie maxillaire.
- b) Permet un mouvement vers le bas du plan occlusal antero posterieur.
- c) Est indiqué dans la classe III par brachygnathie maxillaire.
- d) Permet d'augmenter la longueur de la base maxillaire ENA-ENP de 10 mm

**ResiDentaire**

Plateforme de QCM Médecine Dentaire