

Centre hospitalo-universitaire Alger Centre
Service de pathologie et chirurgie buccale
1^{er} Contrôle continu

Cochez la ou les réponses justes :

- 1- Il s'agit d'une thrombopénie, lorsque :
 - a- Le taux de plaquettes est inférieur à 50 000/mm³.
 - b- Le taux de plaquettes est inférieur à 150 000/mm³
 - c- Le taux de plaquettes est inférieur à 500 000/mm³
 - d- Toutes les réponses sont fausses
- 2- Le volume globulaire moyen (VGM)
 - a- Correspond au volume moyen des globules blancs
 - b- Correspond au volume moyen des globules rouges
 - c- En présence d'une anémie avec un VGM élevé, on évoque une anémie macrocytaire
 - d- Le VGM peut augmenter au cas de déficit en vitamine B12
- 3- Un patient nécessite une extraction dentaire, si le taux des plaquettes est > 80 000/mm³
 - a- Il faut une transfusion de plaquettes en complément des moyens locaux d'hémostase.
 - b- Les procédures locales d'hémostase seront suffisantes.
 - c- Il faut demander un INR avant l'extraction dentaire
 - d- Il faut demander un TCA avant l'extraction dentaire
- 4- L'INR :
 - a- Explore la voie endogène de la coagulation.
 - b- Sa valeur est indépendante du laboratoire.
 - c- L'INR normal est de 1 lorsque le temps du malade égale celui du témoin.
 - d- Diminue lorsque le patient est soumis aux anti vitamine K.
 - e- La prise en charge du patient diabétique nécessite, fin d'évaluer son équilibre
 - a- Une glycémie à jeun
 - b- Une hémoglobine glyquée
 - c- Les clichés rétro-carnaires (bite-wing) permettent de:
 - a- Decter des réactions péri apicales
 - b- Dépister précocement des caries proximales
 - c- Détecter les reprises de caries sous amalgame
 - d- Toutes les réponses sont justes
- 7- La Radiovisigraphie (RVG):
 - a- Est une radiographie tridimensionnelle.
 - b- Permet l'utilisation d'un zoom qui donne une image de grossissement supérieure à la taille réelle
 - c- Les images peuvent être transférées chez un confrère.
 - d- Le développement du film grâce à une chambre noire
- 8- L'incidence face basse bouche ouverte :
 - a- Est l'examen de choix pour l'étude des sinus maxillaires.
 - b- Fournit une vue frontale des parties de la mandibule visibles de profil et : l'orthopantomogramme.
 - c- Est une radiographie tridimensionnelle
 - d- Toutes les réponses sont fausses
- 9- L'incidence de Schüller :
 - a- Permet d'étudier la morphologie des dents de sagesse mandibulaires
 - b- Est une incidence qui permet l'étude des ATM
 - c- Nécessite une incidence en en bouche ouverte et en bouche fermée.
 - d- Toutes les réponses sont justes
- 10- En radiologie, une image est dite « radli claire » :
 - a- Lorsqu'elle apparaît noire sur le cliché
 - b- Lorsqu'elle apparaît blanche sur le cliché
 - c- Lorsqu'elle est bien limitée par un liséré de condensation, elle évoque une pathologie bénigne

- 11- Les molécules anesthésiques les plus allergisantes sont :
- a- Les esters
 - b- Les amides esters
 - c- Les amides.
- 12- L'anesthésie tronculaire à l'épine de Spix :
- a- Permet d'anesthésier l'hémi-mandibule et l'hémi-langue homolatérale
 - b- L'adjonction d'adrénaline n'est pas contre-indiquée
 - c- Est nécessaire pour l'avulsion des molaires mandibulaires
 - d- Il n'est pas nécessaire de la compléter d'une anesthésie locale
- 13- Le vasoconstricteur est contre-indiqué chez :
- a- Les hypertendus même stabilisés.
 - b- Les asthmatiques
 - c- Les patients diabétiques équilibrés quelque soit l'état de leur équilibre
 - d- Toutes les réponses sont fausses
- 14- Parmi les complications de l'anesthésie tronculaire du nerf alvéolaire inférieur :
- a- Risque de hémorragies vasculaires
 - b- Risque de fracture mandibulaire
 - c- Risque de paralysie faciale transitoire
 - d- Toutes les réponses sont justes
- 15- L'extraction d'une molaire mandibulaire nécessite :
- a- Une anesthésie tronculaire associée à une anesthésie locale
 - b- Une anesthésie locale seule est suffisante
 - c- Une anesthésie tronculaire seule est suffisante
 - d- Toutes les réponses sont fausses
- 16- L'anesthésie tronculaire du nerf alvéolaire inférieur :
- a- Permet une anesthésie à distance du point d'injection dans tout le territoire d'innervation.
 - b- L'adjonction d'adrénaline n'est pas contre-indiquée.
 - c- Elle ne déforme pas les structures anatomiques
 - d- Toutes les réponses sont justes
- 17- Lors de la syndesmectomie au niveau de la 18, nous avons besoin de :
- a- Un syndesmectome coudé
 - b- Deux syndesmectomes : un mesial et un distal
 - c- Le minimum des tables osseuses pour éviter le dérapage.
 - d- Toutes les réponses sont fausses
- 18- En vue d'une extraction dentaire, le praticien se placerait derrière le patient si il s'agit d'une :
- a- 16
 - b- 28
 - c- 38
 - d- 47
- 19- L'extraction de la 36 nécessite :
- a- Une anesthésie locale vestibulaire
 - b- Une anesthésie locale linguale
 - c- Une anesthésie tronculaire du nerf alvéolaire inférieur
 - d- Une anesthésie tronculaire du nerf lingual
 - e- Une anesthésie du nerf facial
- 20- L'anesthésie intra-ligamentaire :
- a- Remplace l'anesthésie locale
 - b- Est indiqué en cas de pulpitis
 - c- Nécessite un anesthésique non adrénaliné