

H. Cuyon

lez la ou les réponses justes :

En cours d'une anesthésie, la paralysie faciale :

- A. Peut survenir à l'occasion d'une anesthésie locale
- B. Peut-être évité par l'utilisation d'un anesthésique non adréaliné
- C. Est une complication temporaire
- D. Toutes les réponses sont fausses

escarre, suite à une anesthésie :

- A. Peut être due à une injection brutale ou à l'utilisation d'un produit anesthésique trop froid.
- B. Correspond à une nécrose ischémique des tissus
- C. Complique une anesthésie tronculaire.
- D. Toutes les réponses sont justes

alvéolite suppurée :

- A. Est due à une ischémie par l'emploi du vasoconstricteur
- B. Est due à une infection du caillot
- C. Cliniquement, l'alvéole est béant mettant à nu l'os alvéolaire
- D. Cliniquement, l'alvéole est comblé par des sécrétions purulentes

fracture de la tubérosité :

- A. Peut compliquer l'extraction d'une dent de sagesse mandibulaire
- B. Peut compliquer l'extraction d'une canine incluse
- C. Peut s'accompagner d'une CBS.
- D. Peut être dû à un mouvement de luxation brusque.

Le malaise hypoglycémique se caractérise par :

- A. Pâleur
- B. Sueurs profuses
- C. Pression artérielle augmentée
- D. Toutes les réponses sont justes

lipothymie :

- A. S'accompagne toujours d'une perte de connaissance irréversible.
- B. S'accompagne d'une élévation de la tension artérielle
- C. S'accompagne d'une faiblesse musculaire
- D. Survient volontiers chez un patient anxieux

syncope :

- 1. S'accompagne d'une perte de connaissance totale
- 2. Ne s'accompagne pas d'une perte de connaissance
- 3. S'accompagne d'un tremblement des extrémités.
- 4. Est également appelée crise convulsive

accidents allergiques liés à l'emploi d'une solution anesthésique sont :

- 1. Rares
- 2. Fréquents
- 3. Survient plus volontiers chez un patient avec un terrain allergique

accidents neurologiques de surdosage :

- 1. Sont dus à une dose administrée totale d'anesthésie trop importante
- 2. Peuvent être dus à une administration intravasculaire accidentelle
- 3. L'évolution défavorable se fait vers la crise convulsive avec perte de connaissance
- 4. Toutes les réponses sont fausses.

L'œdème de Quinck :

- A S'accompagne souvent d'une crise convulsive
- B Est une complication allergique
- C Peut s'accompagner d'un risque d'asphyxie et de détresse respiratoire.
- D Toutes les réponses sont justes

Le choc anaphylactique :

- A Constitue la réaction la plus grave
- B S'accompagne d'une sensation de mort imminente
- C Est une complication fréquente de l'anesthésie trachéotomique.
- D Toutes les réponses sont justes

12- Les éponges hémostatiques:

- A Est un produit hémostatique résorbable.
- B Est un produit hémostatique non résorbable.
- C Offre une protection antibactérienne postopératoire.
- D Doit être renouvelée toutes les 24 heures

13- La gouttière hémostatique est :

- A Un moyen d'hémostase intrinsèque
- B Permet la protection du site opératoire
- C Est un moyen d'hémostase intéressant chez le patient à risque hémorragique.
- D Toutes les réponses sont justes

14- Le drainage :

- A Est toujours indiqué dans le cas d'une cellulite d'origine dentaire quel qu'en soit le stade
- B Se pratique à la zone la plus déclive de la tumeur
- C Permet le soulagement du patient
- D Est un geste d'urgence
- E Toutes les réponses sont justes

15- Le drainage d'une cellulite suppurée permet de :

- A Éliminer les conditions d'anaérobiose
- B Pratiquer un lavage de la cavité
- C Prévenir le passage vers la forme séreuse.
- D Toutes les réponses sont justes

16- Le traitement symptomatique d'une cellulite suppurée d'origine dentaire consiste en :

- A Extraction dentaire
- B Prescription médicale
- C Incision- Drainage
- D Toutes les réponses sont justes

17- L'extraction dentaire dans le cadre d'une cellulite d'origine dentaire doit être :

- A Réalisée en dehors de l'épisode aigu
- B Effectuée à chaud
- C Réalisée avec un anesthésique sans vasoconstricteur
- D Toutes les réponses sont fausses

18- Les dents antrales sont :

- A Deuxième prémolaire mandibulaire
- B Première prémolaire maxillaire
- C Deuxième molaire maxillaire
- D Toutes les réponses sont justes

19- Le test de Valsalva :

- A Consiste en un pincement des narines et expiration buccale
- B Consiste en un pincement des narines et inspiration nasale
- C Permet de poser le diagnostic de CBS
- D Toutes les réponses sont justes

20- Le traitement de la CBS précoce permet d' :

- A Isoler le sinus maxillaire de la cavité buccale
- B Éviter le passage de la CBS récente à la CBS établie
- C Éviter l'apparition de sinusite maxillaire
- D Toutes les réponses sont fausses