

Nom..... Prénom.....

chez la réponse juste. Il y'a une seule réponse juste**ans les algies vasculaires de la face, la douleur est causée par :**

- Un dysfonctionnement du système physiologique de transmission du message nociceptif ✗
- Une dilatation vasculaire comprimant le VII
- Une dilatation vasculaire comprimant le V
- Un dysfonctionnement du système nerveux périphérique ✗

ans la névralgie trigéminalle essentielle, parmi les signes cliniques permettant le diagnostic positif :

- La persistance d'un fond douloureux entre les accès avec parfois paresthésie et hypoesthésie
- Une localisation unilatérale constante de la douleur dans le territoire carotidien ✗
- L'existence de la zone gâchette comme facteur déclenchant ✗
- L'association de signes vasomoteurs

traitement de 1^{ère} intention pour une névralgie essentielle, qui constitue un test diagnostique est :

- Les benzodiazépines
- La prégabaline
- La carbamazépine
- L'amitriptyline

diagnostic différentiel de la tuberculose buccale se fait avec :

- Cicatrice rétractile muqueuse
- Chancre de syphilis primaire
- Une ulcération atraumatique
- Une Actinomyose

avant une adénite cutanée rebelle au traitement antibiotique, l'interrogatoire doit rechercher :

- Syphilis primaire
- La notion d'amaigrissement et de sueurs nocturne
- Atteinte d'une pathologie articulaire
- Aucune des réponses n'est juste

la syphilis est une maladie infectieuse, contagieuse dont les manifestations buccales :

- Se voient au stade primaire de la maladie
- Se voient au stade terminal de la maladie
- Se voient à tous les stades de son évolution
- Sont plus marquées lors de la Syphilis congénitale

quel est le signe clinique d'une paralysie faciale périphérique :

- Signe des cils de Souques
- Signe de Charles Bell
- Chute de la langue
- Traits et rides déviés du côté atteint

la paralysie faciale centrale se caractérise par:

- Une prédominance sur le territoire facial supérieur ✗
- Des causes essentiellement vasculaires et tumorales
- Un signe apparent des cils de Souques
- Le signe de Charles Bell ✗

quel est le traitement d'une paralysie faciale de Charles Bell est on doit éviter :

- Kinésithérapie
- Corticothérapie
- Antibiothérapie
- Traitement antiviral

1 complication la plus fréquente sur l'entail dentaire est représentée par :

- La crise de létargie
- Les accidents allergiques
- Le malaise hypoglycémiant
- La léthargie

malaise hypoglycémiant :

- Est fréquent en cas de diabète de type 1
- Ne peut pas entraîner un coma
- Nécessite une injection sous cutanée de glucagon pour un patient conscient
- Toutes les réponses sont justes

a diapromie :

- Est provoquée par des phénomènes de succion ou d'aspiration
- Son siège de préférence est la face externe des joues
- Est une tumeur bénigne hyperplasique de la gencive
- Se rencontre chez la femme enceinte

e butryomycome :

- Est une réponse inflammatoire exagérée face à un traumatisme ou suite à une extraction
- Serait associée à un facteur viral
- Est observé exclusivement chez l'enfant.
- Résulte de l'accumulation de liquide hémattique dans l'espace sous gingival entourant une dent en éruption

hypertrophie gingivale peut être en rapport avec :

- Diphénylhydantoinate de soude
- Pénicilline
- Nifluril
- Rénitidine

a Marsupialisation est le traitement :

- Peut permettre l'éruption spontanée d'une dent mature
- Nécessite une biopsie de la paroi kystique à l'occasion du premier temps opératoire.
- Des kystes radiculo-dentaires
- Des kystes épidermoïdes

i kystes des maxillaires dérivent du :

- Des restes épithéliaux de Malassez,
- Des résidus de l'extraction dentaire
- Bourgeon dentaire
- Foramen apicale

e kyste d'éruption :

- Est Assimilé à un hématome de l'éruption.
- A une coloration jaunâtre
- S'accompagne d'une perte spontanée de la dent causale.
- Est similaire au kyste sébacé.

e kyste résiduel

- Est un kyste radiculo-dentaire inflammatoire.
- Est caractérisé par une image radio opaque
- Est similaire au kyste gingival de l'adulte.
- Se traite par marsupialisation.

'Ostéome vrai

- Résulte de la prolifération uniquement d'os spongieux
- Est de siège périostique ou centro-osseux
- Est souvent symptomatique très douloureux et de croissance rapide
- Résulte de la prolifération cartilagineuse au sein de l'os

e Syndrome de Gardner associe :

- Des granulomes multiples
- Une polypose adénomateuse recto colique
- Des cémentomes multiples
- Des kystes gingivaux multiples

FACULTÉ DE MÉDECINE
UNIVERSITÉ D'ALGER IUNIVERSITÉ D'ALGER I
FACULTÉ DE MÉDECINE

Epreuve de Patho - 3^{ème} année de médecine dentaire -2019/2020

Date de l'épreuve : 24/10/2020

Page 1/1

Corrigé Type

Barème variable par question

N°	Rép.	Barème
1	C	1
2	C	1
3	C	1
4	B	1
5	B	1
6	C	1
7	B	1
8	B	1
9	C	1
10	D	1
11	A	1
12	A	1
13	A	1
14	A	1
15	B	1
16	A	1
17	A	1
18	A	1
19	B	1
20	B	1
21		0
22		0
23		0
24		0
25		0
26		0
27		0
28		0
29		0
30		0
31		0
32		0
33		0
34		0
35		0

N°	Rép.	Barème
36		0
37		0
38		0
39		0
40		0