11- Les explorations biologiques :
a- Sont dictées par l'examen clinique
b- Permettent une évaluation diagnostique et thérapeutique
c- Contribuent à l'établissement d'un diagnostic positif
d- Sont indispensables à l'établissement d'un plan de traitement pour tous les patients

12- L'anesthésie locale :
a- Doit être réalisée sous des conditions d'asepsie
b- Doit comporter l'anesthésie tronculaire mandibulaire en vestibulaire et linguale
c- Permet l'anesthésie d'un tronc nerveux
d- Toutes les réponses sont justes

13- L'anesthésie intra-ligamentaire :
a- Est indiquée dans les cas de desmodontites
b- Peut être réalisée en première intention
c- Est contre- indiquée chez les patients qui présentent un risque hémorragique
d- Toutes les réponses sont fausses

14- L'adjonction de la noradrénaline à la molécule anesthésique permet de :
a- D'améliorer la qualité de l'anesthésie
b- D'assurer une meilleure analgésie chez les patients diabétiques
c- De freiner le saignement post opératoire
d- Toutes les réponses sont justes

15- La séparation des racines pour l'extraction des molaires mandibulaires :
a- Permet de prévenir une fracture des tables osseuses
b- Doit être envisagé en première intention afin de préserver les parois osseuses
c- Elle est en forme de « I »
d- Ne doit jamais être effectuée avec la turbine

16- L'optimisation de l'extraction dentaire impose :
a- L'analyse de l'examen radiographique afin d'apprécier la configuration coronaire
b- Le choix d'une instrumentation adaptée
c- La connaissance de l'anatomie radiculaire
d- Toutes les réponses sont justes

17- L'extraction dentaire de la 46 :
a- Peut être réalisée avec une anesthésie tronculaire seule
b- Nécessite un complément anesthésique lingual
c- Impose une luxation dans la furcation radiculaire dans le cas de séparation de racines
d- Toutes les réponses sont fausses

18- La gestion atraumatique d'une extraction dentaire :
a- Permet de préserver le capital ostéo-muqueux
b- Fait appel à une alvéolectomie
c- Impose une étude clinique rigoureuse
d- Optimise la restauration prothétique

19- Quel est l'objectif immédiat d'une extraction dentaire ? Commentez votre réponse.(2pts)

[redacted]

Nom : [redacted] Prénom : [redacted]

Cocher la ou les réponses justes :

2- L'anesthésie à l'azote de Sato a une action sur le :
- Nerf alvéolaire supérieur
- Nerf lingual
- Nerf labial inférieur
- Toutes les réponses sont justes

3- L'anesthésie utilisée dans les produits anesthésiques permet :
- De diminuer le temps de saignement
- D'améliorer la qualité de l'anesthésie
- De réduire le temps de travail
- Toutes les réponses sont fausses

4- L'anesthésie est «contre-indiquée chez :
- L'hémophile
- La cardiopathe
- Le sujet diabétique
- Le patient irradié

5- L'interrogatoire du patient permet :
- D'établir le diagnostic positif
- D'orienter l'examen clinique
- De proposer un plan de traitement
- Toutes les réponses sont justes

6- La prescription des examens complémentaire :
- Est guidée par l'examen clinique
- Permet d'aboutir à un diagnostic positif
- Est toujours réalisée
- Toutes les réponses sont justes

7- Une image radio-opaque :
- Est une image qui apparait blanche sur les clichés radiographiques
- Elle matérialise une perte de substance
- Elle laisse pas passer les rayons radiographiques
- Toutes les réponses sont justes

8- La radiographie panoramique :
- Est un examen de débrouillage de seconde intention
- Elle permet une vue d'ensemble bi temporale
- Peut être utile pour l'établissement d'un diagnostic étiologique
- Toues les réponses sont justes

8- Le cône Beam :
- Est souvent demandé en première intention
- Est utile pour définir la troisième dimension de l'objet étudié
- Permet de compléter l'interprétation de la radiographie panoramique
- Toutes les réponses sont justes

9- La radiographie rétro-alvéolaire :
- Offre une meilleure définition de l'objet que la radiographie panoramique
- Peut être réalisée en première intention
- Est une technique reproductive sans angulateur
- Toutes les réponses sont justes

10- L'anesthésie tronculaire :
- Permet une insensibilité limitée au tronc nerveux
- Autorise l'extraction d'un groupe de dents
- Est nécessaire pour l'extraction des molaires maxillaires
- Limite la quantité d'anesthésiques locaux utilisés