

10. L'anticoagulation

- a. Est réalisée suite à une prescription dentaire
- b. Permet de guider la prescription antibiotique
- c. Ouvre le choix de l'antibiotique

Toutes les réponses sont fausses

Hémorragie post-extractionnelle :

- a. Est souvent d'origine générale
- b. Est associée à des lésions de l'os maxillaire
- c. Est traitée par des antibiotiques

Toutes les réponses sont fausses

11. Prévention d'une hémorragie de cause locale :

- a. Seule à une application de l'hydrocortisone
- b. Est basée à une compression mécanique et pharmacologique
- c. Comme indiqué l'application d'un vasoconstricteur

Toutes les réponses sont fausses

12. Hémorragie de cause générale :

- a. Peut être induite par un manque d'un facteur de coagulation
- b. Est traitée par une compression locale
- c. Ne s'accompagne pas d'un trouble des paramètres de l'hémostase

Toutes les réponses sont fausses

13. Hémorragie :

- a. Accompanye d'un trouble de la coagulation
- b. Est associée à un dérèglement du produit amyloïde
- c. Se manifeste par un écoulement des arrières

Toutes les réponses sont fausses

Le patient est en charge de la hémorragie post-extractionnelle :

- a. La prise en charge de la hémorragie post-extractionnelle
- b. La prise en charge de la hémorragie post-extractionnelle
- c. La prise en charge de la hémorragie post-extractionnelle

Toutes les réponses sont fausses

14. Hémorragie :

- a. Accompanye d'un trouble de la coagulation
- b. Elle s'installe progressivement
- c. Elle est incomplète

Toutes les réponses sont fausses

15. Le symptôme clinique de l'hypoglycémie est :

- a. Fièvre
- b. Irritabilité
- c. Urticaire
- d. Œdème facial

16. Malaise allergique :

- a. Est souvent induit par des molécules anesthésiques du groupe amide
- b. Se manifeste par un tremblement des extrémités
- c. Est gérée par l'administration d'un antihistaminique

Toutes les réponses sont fausses

17. Communication bucco-sinusienne est :

- a. Traitée par l'isolement du sinus maxillaire de la cavité buccale
- b. Prévenue avec certitude par la réalisation d'une radiographie panoramique
- c. Induite par un dérapage lors de l'extraction de la canine maxillaire

Toutes les réponses sont fausses

18. Citez les paramètres à demander pour explorer l'hémostase d'un patient :

TSAB, TNS, TP, TS, TCA, anticlotinants et plaquette

3. L'abêtissement :

Complication, souvent, une anesthésie sans ligaments par vasodilatation
Est la conséquence d'une infection locale de l'apex dentaire

Nécessite, impérativement, une antibiothérapie
Toutes les réponses sont justes

4. L'abêtissement suppuré est :

Exacerbé par une infection mandibulaire

Favorisé par la présence de l'abcès dans l'abcès

Traité par des anti-inflammatoires aigus

Toutes les réponses sont justes

Une dent saine est une dent :

Extrange

Qui communique avec les fosses nasales

Qui expose à une communication bucco-auriculaire

Qui peut concerner toutes les dents maxillaires

5. La manœuvre de Valsalva :

Permet de poser le diagnostic d'une communication bucco-auriculaire

Doit être systématique après chaque extraction d'une dent maxillaire

Consiste à boucher le nez du patient et à lui demander de souffler par la bouche

Toutes les réponses sont justes

6. La manœuvre de Nelaton :

Permet de constater une fracture de l'angle mandibulaire

Assure une immobilisation de la mandibule

Permet de résoudre une luxation des ATM

Permet de réduire une luxation complète de l'ATM

La lésion du nerf mentonnier lors d'une extraction dentaire est occasionnée par :

Un surdosage du produit anesthésique

Un dérapage d'instruments

Une fracture d'un apex dentaire

Une plaie labiale

L'hypoesthésie labiale inférieure post-extractionnelle :

Peut être induite par une compression inflammatoire consécutive à l'extraction d'une dent

Est traitée par une antibiothérapie

Est irréversible

Est traitée par des antalgiques

Le trismus post-extractionnel :

Est induit par l'extraction d'une incisive

Peut être occasionnée par une cellulite post-extractionnelle

Est traité par des antalgiques

Toutes les réponses sont fausses

Le drainage d'une collection purulente :

Permet d'éliminer les conditions d'anaérobies

Ne doit pas être réalisé en même temps que l'extraction dentaire

S'accompagne d'un traitement antalgique seul

Est réalisé dans les cellulites séreuses.