

Le 02/11/2020

durée : 50 minutes

[De 1 – 20] Cochez la ou les réponses correctes (20 points) :

1. les signes cliniques des pertes de substances maxillaires :
- a. sont moins importants dans les grandes pertes de substances.
 - b. sont plus marqués par les perforations vestibulaires *Répond*
 - c. sont moins marqués par les perforations palatines
 - d. varient selon le siège

2. parmi les conséquences des pertes de substance mandibulaires on trouve

- a. des troubles phonatoires
- b. le pronostic vital mis en jeu
- c. des troubles fonctionnelles
- d. des troubles respiratoires

3. La dysplasie fibreuse :

- a. est d'étiologie inconnue.
- b. touchant exclusivement les sujets âgés
- c. est toujours polyostéotique
- d. est caractérisée par une tuméfaction dure, déformant la mandibule.

4. L'ostéogénèse imparfaite est :

- a. caractérisée par une fragilité osseuse excessive *Répond*
- b. une ostéopathie acquise
- c. fréquente
- d. associée souvent à une dentinogénèse imparfaite.

5. Les fentes du palais primaire sont :

- a. acquises.
- b. congénitales.
- c. fréquente.
- d. uni latérales dans 80% des cas.

6. Parmi les facteurs favorisant l'apparition des fentes alvéolo-palatines on peut citer :

- a. la prise des antibiotiques durant la grossesse
- b. fécondation in vitro (1 cas / 200 naissances).
- c. prise d'antiépileptiques pendant la grossesse.
- d. alcoolisme parental.

7. La fente labio-alvéolo-narinaire (fente du palais primaire) est :

- a. caractérisée par une bifidité de la lèvre
- b. toujours unilatérale.
- c. associée à un désordre fonctionnel important
- d. de préjudice esthétique peu important.

8. Le traitement des fentes alvéolo-palatines est :

- a. médicamenteux.
- b. chirurgical précoce
- c. orthophonique
- d. chirurgical tardif.

9. La perte de substance maxillaire :

- a. est une solution transitoire de la continuité osseuse
- b. est acquise.
- c. aboutit toujours à des troubles fonctionnels importants
- d. est exclusivement iatrogène

10. Parmi les causes des pertes de substance mandibulaires on peut citer :

- a. les accidents balistiques.
- b. le retard de la croissance des maxillaires
- c. la radiothérapie cervico-faciale.
- d. l'exérèse d'un carcinome du plancher buccal.

11. Le chérubisme :

- a. débute à l'âge de 30 à 35 ans
- b. apparaît pendant la petite enfance
- c. est caractérisé par une tuméfaction exclusivement maxillaire
- d. est associée à des agénésies dentaires

12. La maladie de Paget :

- a. est une ostéodystrophie bénigne
- b. se caractérise par une hypertrophie et déformation des pièces osseuses par accélération du remodelage osseux
- c. touche la mandibule plus que le maxillaire
- d. est d'évolution rapide

13. La parathormone :

- a. est une hormone protéique sécrétée par la glande parathyroïde.
- b. est une hormone hypo-calcimante
- c. elle agit sur l'os et favorise l'ostéolyse.
- d. elle agit sur l'os en diminuant l'ostéolyse ostéoclasique.

14. Le Syndrome de Pierre Robin :

- a. est une dysostose constitutionnelle des grands syndromes mal formatifs
- b. comprend une fente vélaire et / ou une fente palatine.
- c. est associé à une maladie cardiaque.
- d. est caractérisé par la présence à la naissance d'une macromandibule.

15. Les kystes congénitaux de la tête et du cou :

- a. sont des malformations méconnus.
- b. sont causés par la prise de tétracycline pendant la grossesse.
- c. sont causés par un défaut de coalescence des bourgeons faciaux et branchiaux
- d. leur traitement est exclusivement médicamenteux.

16. la pycnodysostose est caractérisée :

- a. par des sutures crâniennes larges
- b. par une ostéolyse des phalanges distales
- c. par une éruption dentaire prématurée
- d. par une hypoplasie de l'angle mandibulaire.

17. la dysplasie cleido-cranienne :

- a. correspond à un défaut de développement des os du crâne.
- b. est caractérisée par une voûte palatine large
- c. est caractérisée par une macrodontie
- d. est caractérisée par l'absence complète des clavicules dont 100 pour cent des cas.

18. le traitement de la PDS maxillaire est :

- a. chirurgical
- b. médicamenteux
- c. basé sur la prothèse maxillo-faciale
- d. étiologique

19. la PDS est :

- a. une destruction osseuse acquise
- b. une destruction osseuse congénitale
- c. une solution de continuité permanente
- d. une solution de continuité provisoire

✓ 20. la dystrophie est :

- a. une lésion acquise
- b. d'évolution rapide
- c. une lésion fréquente chez les sujets âgés
- d. souvent localisées.

