

1) Dans la pulpite aigue séreuse, la douleur est :

- Spontanée
- Provoquée
- Pulsatile
- Continue
- Intermittente

2) La pulpite à rétro :

- Est d'origine carieuse
- Nécessite un traitement cémentogène
- Nécessite un traitement parodontal uniquement
- Est en rapport avec la poche parodontale
- Toutes les réponses sont justes

3) La pulpite aigue peut être causée par :

- Les sous-occlusions
- Les variations d'altitude
- La radiothérapie
- La radiographie
- Toutes les réponses sont justes

4) Le traitement de la pulpite aigue totale consiste à réaliser :

- Un coiffage pulpaire direct
- Un coiffage pulpaire indirect
- Un traitement cémentogène
- Un traitement ostéo-cémentogène
- Un traitement dentinogène

5) Le diagnostic différentiel de la nécrobiose se fait avec :

- La pulpe symptomatique
- La pulpe asymptomatique
- L'hypoplasie post-traumatique
- La gangrène pulpaire
- La dégénérescence pulpaire

19/ L'étiologie des infections pulpaire et dentinaire peut être :

- Les infections bactériennes sous les restaurations non étanches
- Accidentellement au cours d'une préparation dentaire
- Un traumatisme
- La carie pulpaire

20/ Dans la pulpite chronique ouverte ulcérée :

- La pulpe exposée est ulcérée
- Le test au froid est positif
- Un bouierge alimentaire peut indiquer un épisode aigu
- Une évolution favorable et cicatrisation sont possibles
- La chambre pulpaire est fermée

21/ Les produits du catabolisme des hydrates de carbone sont essentiellement :

- Les acides lactiques
- Les acides acétiques
- Les acides aminés
- CO₂ et H₂O
- NH₃

22/ L'examen clinique des mortifications pulpaire se caractérise par :

- Des tests de sensibilité positifs
- La présence ou pas de dyschromie
- La présence d'une cavité de carie
- Une odeur nauséabonde
- Toutes les réponses sont justes

23/ Le produit d'irrigation idéal doit :

- Avoir une tension superficielle haute
- Etre germicide et bactéricide
- Avoir une tension superficielle basse garder en suspension les débris dentinaires et pulpaire
- Dissoudre les résidus organiques
- Toutes les réponses sont justes

11/ L'hydroxyde de calcium est :

- Un moyen d'irrigation
- Un moyen d'assécher
- Un produit acide
- Son pH varie entre 10 et 12
Il peut atteindre à une concentration commerciale entre 0,5% et 5,25 %

12/ L'hydroxyde de calcium a :

- Une action Anti-inflammatoire
- Une action hémostatique
- Une action Antimicrobienne
- Une activité ostéo-inductrice
- Toutes les réponses sont justes.

13/ La formule chimique de l'hydroxyde de calcium est :

- Ca_2OH
- $\text{Ca}(\text{OH})$
- $\text{Ca}\text{O}\text{H}_2$
- Ca_2OH_2
- Ca OH

14/ La cavité d'accès :

- A pour objectif l'élimination du plancher pulpaire
- Permet le passage des instruments endodontiques
- Nécessite l'utilisation d'une instrumentation spécifique
- Permet la pénétration du I&I coronaire
- Un pour objectif l'élimination partielle du plafond pulpaire

15/ La fraise Zekrya-Endo

- Permet de traverser la couronne métallique
- Est une fraise boule avec une pointe mousse
- Permet d'élargir et de finir la cavité d'accès
- Sa particularité est sa pointe mousse

- Toutes les réponses sont justes

16/ Les instruments de préparation canalaire mécanisé en NiTi

- Sont utilisés en rotation continue
- Ils ont tous des concavités élevées variables sur la lame
- Ils ne respectent pas les normes ISO
- Ils respectent mieux l'anatomie canalaire
- Présentent des concavités majorées

17/ L'anesthésie locale

- Est une privation temporaire de la sensation
- Est souvent associée à un état d'inconscience
- Utilise des drogues
- Peut être à l'origine de complications
- Toutes les réponses sont justes

18/ Le vasoconstricteur

- Réduit le risque de surdosage
- Permet d'augmenter l'efficacité de l'anesthésie
- Augmente le risque de toxicité
- Peut présenter des contre-indications
- Aucune réponse juste

19/ l'anhydride arsenieux

- Peut être mortel à une certaine dose
- Entraîne une intoxication cellulaire par asphyxie
- Est un escharotique
- Est utilisé pour réduire l'hyperesthésie dentinaire
- Toutes les réponses sont justes

20/ La pulpe chronique ouverte hyperplastique

- Est une forme exclusive des dents temporaires immatures
- Évolue souvent chez le jeune patient
- La tendance à la nécrose est importante
- Elle est traitée par un collage pulpaire direct
- Elle est traitée par une thérapeutique cémentogénique