

La cellulite odontogène

- ☐ Est une complication locale d'une parodontite chronique
- ☒ Envahit les tissus de remplissage des espaces bucco-cervicaux faciaux
- ☐ Le traitement de première intention consiste juste à effectuer un traitement conservateur ou non de la dent causale.
- ☐ Aucun contrôle n'est envisageable.

Cellulite gangreneuse

- ☐ Est circonscrite
- ☒ Ces complications sont graves et le pronostic vital est potentiellement mortel
- ☐ Une prescription antibiotique suffit avec un contrôle après 72 heures
- ☐ Le pronostic vital du patient ne dépend pas du temps écoulé entre la diffusion de l'infection et l'hospitalisation

La résorption inflammatoire interne :

- ☒ Est une résorption progressive.
- ☐ Est une résorption transitoire.
- ☐ Se situe en cervical
- ☐ Peut être latérale
- ☒ Nécessite un traitement endodontique

L'ankylose :

- ☐ Est une résorption inflammatoire
- ☒ Est une résorption non inflammatoire
- ☐ La lésion se situe en latéral
- ☒ Elle est consécutive à une expulsion
- ☒ Peut être consécutive à une intrusion

La résorption de surface :

- ☒ Est une résorption transitoire
- ☐ Peut être perforante
- ☐ Est une résorption progressive
- ☐ Nécessite un traitement endodontique
- ☒ Peut se situer en latéral ou au niveau de l'apex

La résorption inflammatoire cervicale :

- ☒ Est une résorption inflammatoire
- ☐ Se situe au niveau apical
- ☐ Nécessite systématiquement un traitement endodontique
- ☒ Débute au niveau externe de la racine
- ☐ Evolue toujours vers la pulpe

L'antibioprophylaxie est obligatoire dans :

- ☒ La cardiopathie à risque oslérien
- ☒ L'endocardite infectieuse
- ☒ Les valvulopathies
- ☒ Les coronarites
- ☐ La myocardite

Avoir l'avis de l'hématologue pour la prise en charge dentaire en cas :

- ☒ D'hémophilie
- ☒ De purpura
- ☒ De lymphome
- ☐ D'angiome
- ☐ D'hémochromie

L'hypersécrétion des corticosurrénales est due :

- ☒ Au syndrome de Kuschine
- ☐ Au diabète
- ☐ A l'hyperthyroïdie
- ☒ A la glande hypophyse
- ☐ A l'hypothyroïdie

Face aux cardiopathies, le praticien est confronté :

- ☒ Au risque infectieux
- ☒ Au risque hémorragique
- ☒ Au risque syncopal
- ☒ A l'arrêt cardiaque
- ☐ Au risque cardiaque

Une patiente âgée de 30ans, avec un bon état général, présente une couronne
prothétique adaptée sur le plan esthétique et fonctionnel au niveau de la 12.
L'examen clinique révèle la présence d'une fistule en regard de cette dent.

La radiographie d'exploration du trajet fistuleux révèle une obturation
canalaire incomplète avec image radioclaire autour de l'apex de la dent 12.

La procédure de prise en charge de la patiente, comprendra :

- ☐ La dépose de la couronne prothétique
- ☐ Le traitement endodontique orthograde
- ☐ Le retraitement endodontique orthograde
- ☒ La chirurgie endodontique
- ☐ L'extraction de la dent(12)