

Deuxième Examen de Moyenne Durée (2 EMD) : Parodontologie

Date : Dimanche 02/05/21

Durée : 30 Minutes

1. L'entité fonctionnelle odontologique regroupe :
 - a) La pulpe, le desmodonte et l'os alvéolaire,
 - b) L'odonte, le desmodonte et l'os alvéolaire,
 - c) Le cément, les fibres desmodontales,
 - d) Tout le parodonte.
2. La mise en action d'un ancrage orthodontique provoque au niveau des tissus parodontaux sains :
 - a) Des déhiscences osseuses,
 - b) Des réactions histologiques,
 - c) Des remaniements tissulaires plus rapides,
 - d) Aucune réponse n'est juste.
3. Les parodontites aboutissent à une alvéolyse plus ou moins sévère, réduisant ainsi le support osseux des dents atteintes lorsque les forces orthodontiques sont exercées sur :
 - a) Un parodonte sain,
 - b) Une parodontite sévère,
 - c) Une parodontite au stade agressif,
 - d) Un parodonte réduit.
4. Plusieurs lésions parodontales d'origine orthodontique sont observées lors des traitements orthodontiques cochez sur deux groupes de lésions :
 - a) Gingivites, parodontites,
 - b) Rhyzalyse et résorption radiculaire,
 - c) Les lésions infra-osseuses non traitables chirurgicalement (hémisepta, lésion à un mur osseux),
 - d) La destruction de la gencive marginale.
5. Les Ancrages implantaires en orthodontie sont considérés comme :
 - a) Un mode d'ancrage orthodontique idéal,
 - b) Un mode d'ancrage orthodontique nocif,
 - c) Ils sont proscrits,
 - d) Ankylosés et ne peuvent faire l'objet d'un déplacement avec une force orthodontique.
6. La gestion des lésions parodontales aux différents stades de la thérapeutique orthodontique, il est préférable de la réaliser au stade des traitements suivants :
 - a) Avant le traitement ODF,
 - b) Après le traitement ODF,
 - c) Au cours de la maintenance parodontale,
 - d) Le praticien programme la gestion selon les besoins.
7. Afin d'éviter d'aggraver des situations déjà assez complexes de maladies parodontales, on d'en créer d'autres il faut veiller globalement à :
 - a) Eviter tout dérapage lors du placement ou du retrait des élastiques : vrai
 - b) Utiliser des bains de bouche d'une manière continue et répétée : vrai
 - c) Vérifier le jour du collage tout excès de colle, car susceptible de provoquer une inflammation du rebord marginal de la gencive ; Faux
 - d) Une seule réponse est vraie.
8. La lésion endo-parodontale est :
 - a) Une lésion combinée qui résulte de l'association de deux lésions,
 - b) L'une endodontique et l'autre parodontale, évoluant séparément,
 - c) En contact par le foramen apical et les canaux accessoires,
 - d) Qui aboutit à la formation d'une lésion unique qui associe la perte de la vitalité pulpaire et la rupture du système d'attache parodontal.

9. Une perte d'attachement parodontal peut :

AB ✓

- a) Exposer l'ouverture de canaux accessoires et le foramen apical,
- b) Mettre en contact direct les surfaces radiculaires et le contenu des poches parodontales,
- c) Ses micro-organismes peuvent franchir, directement la pulpe,
- d) Provoquer une douleur pulpaire.

10. Une lésion péri-apicale chronique :

AB ✓

- a) Est caractérisée par la présence d'un tissu de granulation richement vascularisé et infiltré de cellules inflammatoires,
- b) Peut engendrer une destruction des fibres desmodontales et une résorption de l'os alvéolaire adjacent,
- c) Peut être l'extension directe d'une nécrose pulpaire,
- d) Peut drainer son contenu purulent par le trajet fistulaire.

11. La destruction des tissus parodontaux peut être associée à :

BCD ✓

- a) La présence d'une dent dont le canal est complètement obturé,
- b) Fractures radiculaires pouvant survenir sur des dents ayant subi un traitement endodontique,
- c) Une irritation chimique déclenchée par la préparation canalair,
- d) Une perforation radiculaire.

12. Le diagnostic des lésions endo-parodontale doit être posé à partir :

AD ✓

- a) De l'étiologie et de la pathogénie des lésions,
- b) De La vitalité pulpaire,
- c) De l'absence de poche parodontale,
- d) De La radiographie qui présente un rôle de confirmation de la clinique.

13. Influence de la thérapeutique parodontale sur la pulpe peut entraîner :

A ✓

- a) Une hypersensibilité dentinaire qui diminue progressivement,
- b) Une irritation mécanique sur l'émail par le détartrage avec les instruments,
- c) Une infiltration des toxines bactériennes dans la pulpe à travers les tubulies dentinaires,
- d) Une nécrose pulpaire par la voie de l'apex et les canaux accessoires.

14. Lésions péri-apicales signalées sont caractérisées par :

BB ✓

- a) La présence d'un kyste péri-apicale,
- b) Une fistule qui peut s'extérioriser dans le sillon gingivo-dentaire ou dans une poche parodontale existante,
- c) Une fistule desmodontale et une fistule osseuse,
- d) Sur les dents pluri radiculées, peuvent se fistuliser dans la zone de la fonction.

15. Dans la classification de SEIBERT et LINDHE, on retrouve :

D ✓

- a) Une gencive kératinisée est moins épaisse et a une hauteur inférieure à 2 mm,
- b) Une gencive kératinisée est normale alors que l'épaisseur d'os alvéolaire est réduite,
- c) Les dimensions gingivales et osseuses sont toutes les deux réduites,
- d) Un parodontite plat et épais.

16. La caractérisation du biotype se fait facilement avec une sonde parodontale :

A ✓

- a) Vrai.
- b) Faux.

17. Le complexe dento-gingival se compose par :

D ✓

- a) L'espace biologique,
- b) L'attache épithéliale,
- c) L'attache conjonctive,
- d) Le sulcus et l'espace biologique.

18. Le joint périphérique :

A ✓

- a) Est la zone de rencontre du tissu dentaire, du tissu gingival et du matériel prothétique,
- b) Est la partie du contour axiale s'étendant du sulcus vers le milieu buccal,
- c) Assure le soutien des tissus parodontaux,
- d) Préviens les inflammations gingivales, les récessions.

19. La limite juxta-gingivale est indiquée dans les restaurations :

A ✓

- a) Du secteur postérieur lorsque l'esthétique n'est pas un facteur limitant,
- b) Du secteur antérieur,
- c) Avec pilier long,
- d) Toutes les réponses sont fausses.

20. L'évaluation parodontale pré prothétique permet d'apprécier :

ABC ✓

- X a) La qualité de la gencive,
- X b) L'espace biologique,
- X c) Le biotype parodontal,
- d) La limite cervicale.

PLATFORME

RESIDENTAIRE



Epreuve de PARO - 5ème - année de médecine dentaire -2020/2021

Date de l'épreuve : 02/05/2021

Page 1/1

Corrigé Type

Barème variable par question - Sujet sur 19,00 pts.

N°	Rép.	Barème
1	B	1
2	D	1
3	D	1
4	AB	1
5	A	1
6	D	1
7		0
8	ACD	1
9	AB	1
10	AB	1
11	BCD	1
12	ABD	1
13	A	1
14	BD	1
15	D	1
16	A	1
17	D	1
18	A	1
19	A	1
20	ABC	1
21		0
22		0
23		0
24		0
25		0
26		0
27		0
28		0
29		0
30		0
31		0
32		0
33		0
34		0
35		0

N°	Rép.	Barème
36		0
37		0
38		0
39		0
40		0

PLATFOME

RESIDENTAIRE