

Cochez la ou les réponses justes.

1. Le dérapage asymétrique :
 - a- Résulte d'un contact prématuré unilatéral postérieur entre les maquettes d'occlusions.
 - b- Résulte des contacts prématurés bilatéraux postérieurs entre les maquettes d'occlusions.
 - c- Se corrige en supprimant le contact prématuré au dépend de la maquette supérieure.
 - d- Se corrige en supprimant le contact prématuré au dépend de la maquette inférieure.
2. Le décollement de la prothèse inférieure suite à une pression digitale sur les incisives est dû soit à :
 - a- Une position trop vestibulée des incisives.
 - b- Un joint périphérique insuffisant dans la région sublinguale.
 - c- Un joint périphérique insuffisant dans la région vestibulaire antérieure.
 - d- Toutes les réponses sont justes.
3. La fatigue des ptérygoidiens externes se fait en demandant au patient de faire :
 - a- Des mouvements récurrents d'ouverture et de fermeture.
 - b- Une propulsion extrême pendant 45 à 60 sec.
 - c- Une ouverture maximale pendant 45 à 60 sec.
 - d- Plusieurs mouvements de déglutition.
4. En prévision de la polymérisation, la cire
 - a- Doit avoir une épaisseur de 2,5mm au centre de la voute palatine
 - b- Assure la solidarisation des maquettes sur leurs modèles
 - c- Permet de protéger les émergences vasculo-nerveuses palatines
 - d- Toutes les réponses sont justes
5. Devant le réflexe nauséux d'origine mécanique le praticien doit :
 - a- Inviter le patient à basculer sa tête en avant.
 - b- Prescrire une prémédication.
 - c- Appliquer un anesthésique au niveau du voile du palais.
 - d- Corriger la situation du bord postérieur de la prothèse supérieure.
6. Avec sa prothèse amovible totale nouvellement insérée le patient doit :
 - a- Croquer l'alimentation dure pour faciliter l'adaptation.
 - b- Apprendre à manger avec sa prothèse dès le premier jour de l'insertion.
 - c- Porter sa prothèse continuellement jour et nuit.
 - d- Porter sa prothèse 8 heures par jour.
7. Le phénomène de Christensen se caractérise par :
 - a- Une désocclusion molaire en latéralité droite.
 - b- Une désocclusion incisive en latéralité.
 - c- Une désocclusion molaire en bout à bout incisif.
 - d- Une désocclusion incisive en propulsion.
8. Les zones de compression au niveau de la prothèse peuvent être détectées
 - a- En faisant passer la pulpe de l'index sur les bords et l'intrados de la prothèse.
 - b- Par un matériau révélateur.
 - c- Par un alginate fluide.
 - d- Par un bruit d'échappement d'air significatif suite à une pression exercée.
9. La relation centrée est une relation :
 - a- D'os à os dépendante des dents à une DVG correcte.
 - b- les condyles occupent la position la plus haute et la plus reculée dans leurs cavités glénoïdes.
 - c- Qui permet d'enregistrer la position de la mandibule par rapport au maxillaire dans le plan sagittal.
 - d- Toutes les réponses sont justes.
10. L'équilibration occlusale :
 - a- Constitue une phase terminale-
 - b- Il s'agit de rechercher et de supprimer les interférences occlusales au cours de tous les mouvements centrés et excentrés
 - c- La suppression des interférences occlusales uniquement au cours des mouvements de latéralité
 - d- la suppression des interférences occlusales uniquement pendant le mouvement de propulsion

11. Pour Carlsson la résorption osseuse sur une période de 25 ans est :
- a- Plus importante à la mandibule qu'au maxillaire.
 - b- Plus importante au maxillaire qu'à la mandibule.
 - c- La même au maxillaire et à la mandibule.
 - d- Deux fois plus importante au maxillaire qu'au la mandibule.
12. Selon Atwood, la résorption osseuse est :
- a- Centrifuge au maxillaire et centripète à la mandibule.
 - b- Chronique, progressive, irréversible et cumulative.
 - c- Très importante au maxillaire qu'à la mandibule.
 - d- Toutes les réponses sont justes.
13. Lors d'une surocclusion
- a- mineure : équilibrage occlusal
 - b- trop importante : refaire la prothèse
 - c- mineure : refaire la prothèse
 - d- trop importante : équilibrage occlusal
14. Lors du montage des modèles sur articulateur semi adaptable il faut :
- a- commencer par le transfert du modèle inférieur sur la branche inférieure de l'articulateur
 - b- commencer par transférer le modèle supérieur sur la branche supérieure de l'articulateur
 - c- le modèle maxillaire doit être situé par rapport au plan de Camper
 - d- le modèle maxillaire doit être situé par rapport au plan axio-orbitaire
15. Tous les articulateurs possèdent une branche supérieure :
- a- Parallèle au plan de Camper
 - b- Parallèle au plan de Francfort
 - c- Parallèle au plan bi pupillaire
 - d- Les 3 propositions a, b et c sont fausses
16. Les dents en ~~céramique~~ sont indiquées lorsqu'on est en :
- a- Présence des dents antagonistes naturelles fortement abrasées
 - b- Présence des dents antagonistes naturelles atteintes d'une parodontopathie.
 - c- Présence des crêtes flottantes.
 - d- Toutes les réponses sont fausses.
17. En prothèse amovible totale, une prématurité occlusale peut conduire à :
- a- une instabilité des prothèses
 - b- des blessures de la gencive
 - c- un problème phonétique
 - d- toutes les propositions sont fausses
18. L'air de sustentation d'Ackermann correspond :
- a- A la région antérieure du maxillaire.
 - b- A la région antérieure de la mandibule.
 - c- A la zone comprise entre le sommet de la crête antérieure et le fond du vestibule maxillaire.
 - d- A la zone comprise entre le sommet de la crête antérieure et le fond du vestibule mandibule.
19. Le concept occlusal utilisé en prothèse totale adjointe est :
- a- la protection canine
 - b- la fonction groupe
 - c- l'occlusion bilatéralement équilibrée
 - d- l'occlusion bilatéralement équilibrée en propulsion
20. L'ébouillantage :
- a- doit être maintenu à 65° pendant 90 mn
 - b- Doit commencer dans une eau froide
 - c- Permet la fonte de la cire
 - d- Toutes les réponses sont justes



Epreuve de Prothèse - 3^{ème} - année médecine dentaire - 2020/2021

Date de l'épreuve : 26/05/2021

Page 1/1

Corrigé Type

Barème variable par question - Sujet sur 19,00 pts.

N°	Rép.	Barème
1	AD	1
2	AB	1
3	B	1
4	B	1
5	D	1
6	D	1
7	C	1
8	B	1
9	C	1
10	AB	1
11	A	1
12	B	1
13	AB	0
14	BD	1
15	B	1
16	D	1
17	AB	1
18	BD	1
19	C	1
20	C	1
21		0
22		0
23		0
24		0
25		0
26		0
27		0
28		0
29		0
30		0

PLATFOME

RESIDENTAIRE

QCM Médecine Dentaire