

NOM /

PRENOM /

Année /

EMO

N°

- La biomécanique utilisée permet de réduire les poussées.
 - L'attache est identique à celle de la technique Edgewise.
 - Des auxiliaires peuvent être ajoutés au système.
- 2 - En technique Edgewise les courbures du troisième ordre .
- Sont réalisées sur un fil de section ronde .016
 - Sont réalisées au cours du 3^{ème} temps du traitement.
 - Sont nommées torque.
 - Permettent un déplacement corono-radulaire de la dent.
- 3 Parmi les avantages de la technique Andrews
- Une facilitation dans la tâche du praticien.
 - Utilisation de brackets contenant toute l'information nécessaire au déplacement dentaire.
 - La mise en place d'arc comprenant des courbures de 3^{ème} ordres.
 - Une position très aisée des brackets
- 4- En technique Invisalign
- Le risque parodontal est important.
 - L'adjonction de taquet est nécessaire pour le déplacement dentaire.
 - La douleur est identique aux thérapeutiques conventionnelles
 - Le port de la gouttière est discontinu.
- 5- La technique Incognito .
- Permet de traiter toutes les anomalies orthodontiques.
 - Les brackets sont standardisés.
 - Les brackets sont coulés puis collés .
 - Les atteintes des muqueuses sont importantes
- 6- Dans la technique de Ricketts :
- On corrige le sens transversal en premier
 - Les arcs sont préfabriqués
 - Les forces sont légères et parfois lourdes
 - Les objectifs de traitement sont visualisés
- 7 - L'arc de base de contraction comporte :
- Des boucles de nivellement et de contraction
 - Un tip back molaire
 - Des courbures du 3^{ème} ordre
 - Une section gingivale plus longue
- 8 - Dans la technique de Ricketts, l'ancrage est assuré par :
- Des ressorts préfabriqués
 - Les courbures de l'arc de base
 - Des TIM de classe II ou de classe III
 - Certains dispositifs auxiliaires
- 9- Parmi les tissus cibles de la thérapeutique orthopédique :
- Le cartilage condylien au niveau de la mandibule.
 - La suture symphysaire.
 - La suture maxillo-palatine.
 - Le muscle lingual.
- 0- L'os sésamoïde:
- Apparaît un an avant le pic pubertaire.
 - Son apparition est un signe de la fin de la croissance.
 - Son apparition représente le moment opportun d'un traitement orthopédique.
 - Son apparition est signe d'une grande poussée de la croissance.

- 11- **Le port d'un appareil orthopédique**
- Doit durer plus de 12 heures par jour chez l'adulte.
 - Peut durer de 10 à 12 mois.
 - Doit être nocturne pour une meilleure efficacité de l'appareil.
 - Doit se faire quelques heures pendant la journée.
- 12- **L'orthodontie pré-prothétique permet :**
- De créer des piliers intermédiaires
 - De réaliser une contention non visible
 - De diminuer la portée d'un bridge
 - D'améliorer la statique d'un bridge
- 13 - **Les mini-vis d'ancrage :**
- Permettent de réaliser des mouvements dentaires asymétriques
 - Permettent de réaliser des mouvements dentaires symétriques
 - Indiquées dans le cas de support parodontal réduit
 - Utilisées comme ancrage indirect
- 14 - **Le Spring-Retainer :**
- Est indiqué dans le traitement de récurrence des incisives supérieures
 - Est indiqué dans le traitement de récurrence des incisives inférieures
 - Est un appareil de contention fixe
 - Est un appareil de contention amovible
- 15 - **Le phénomène de la dérive centripète :**
- S'explique par une modification de l'équilibre musculaire
 - S'observe chez les patients ayant subi un traitement orthodontique
 - S'observe chez les patients n'ayant pas subi un traitement orthodontique
 - S'observe au moment du pic pubertaire
- 16 - **La plaque de Hawley maintient la :**
- Correction de la rotation dentaire
 - Correction de l'expansion antéro-postérieure
 - Correction de l'expansion transversale
 - correction de la classe III squelettique
- 17- **La contention collée « deux-dents » :**
- Est placée au 1/3 occlusal des faces linguales
 - Présente le maximum de longévité
 - Est placée au 1/4 occlusal des faces linguales
 - Indiquée dans le maintien de traitement de rotation des incisives
- 18- **L'équilibration occlusale est indiquée dans le cas :**
- D'extraction unilatérale
 - D'extraction uni maxillaire
 - D'absence d'extraction
 - D'augmentation du diamètre transversal de l'arcade
- 19 - **Dans les mouvements de latéralités les trajets colorés s'observent sur :**
- Les versants internes des cuspides guides vestibulaires maxillaire
 - Les pans distaux des versants internes des cuspides guides maxillaire
 - Les pans mesiaux des versants externes des cuspides d'appui mandibulaires
 - les versants internes des cuspides guides palatines maxillaire
- 20 - **Dans les rapports cuspide-embrasure on observe :**
- Deux zones de contact sur chaque cuspide guide
 - Trois zones de contact sur chaque cuspide guide
 - Deux zones de contact sur chaque cuspide d'appui
 - Deux aires d'appui sur les crêtes marginales