

10. Les vasoconstricteurs :

- a. Diminuent le saignement per-opératoire.
- b. Sont contre-indiqués chez l'hémophile
- c. Augmentent la durée d'anesthésie.
- d. Augmentent la diffusion de l'anesthésie.

11. L'ouverture accidentelle du sinus maxillaire lors de l'avulsion d'une dent extraite se manifeste initialement par :

- a. Un œdème de la lèvre supérieure.
- b. Des douleurs simultanes homolatérales per-opératoires
- c. Une hypoesthésie de la région sous-orbitaire.
- d. Un reflux de liquide par le nez.

12. Une éruption dentaire est retardée :

- a. Lorsqu'elle survient 6 mois après les dates normales d'éruption pour les dents temporaires.
- b. Lorsqu'elle survient 6 mois après les dates normales d'éruption pour les dents permanentes.
- c. Lorsque l'homologue de la dent permanente évolue depuis plus de 6 mois.
- d. Plus fréquemment en dentition permanente qu'en dentition temporaire.

13. Le micromoteur :

- a. Est un accessoire facultatif du fauteuil dentaire.
- b. Permet l'insertion de la turbine.
- c. Permet l'insertion des contre-angles et de pièces à main.
- d. Son sens de rotation peut être choisi.

14. Parmi les contre-indications de l'extraction d'une dent de sagesse, nous citons :

- a. Evolution avec positionnement correcte de la dent sur l'arcade.
- b. Dent cariée à l'origine d'accidents infectieux récurrents
- c. Dent située sur un trait de fracture de l'angle mandibulaire.
- d. Dent saine entravant l'éruption physiologique de la dent adjacente

15. Avant toute extraction dentaire :

- a. L'examen clinique est obligatoire.
- b. L'examen radiologique n'est pas systématique.
- c. La difficulté opératoire est déterminée par l'évaluation de l'état parodontal.
- d. Toutes les réponses sont justes.

16. La filtration du produit anesthésique se fait toujours à distance du foyer infectieux, car :

- a. L'effet anesthésique est moindre.
- b. Le risque d'allergie est augmenté.
- c. Il y a un risque hémorragique important.
- d. Elle peut provoquer un essaimage bactérien à distance.

17. L'éruption dentaire est :

- a. Un mécanisme physiologique qui permet de déplacer la dent depuis son site initial jusqu'à l'occlusion.
- b. Un phénomène mécanique qui permet l'émergence de la dent sur l'arcade.
- c. Coordonnée et régulée par le sac folliculaire.
- d. Coordonnée et régulée par la croissance radiculaire et la pression intra-pulpaire.

18. La fracture d'une table osseuse externe au cours d'une extraction dentaire :

- a. Est parfois mutilante dans la mesure où elle compromet la réhabilitation prothétique.
- b. Peut-être à l'origine d'une dénudation des racines des dents adjacentes.
- c. Le praticien se doit de retirer le fragment osseux qui pourrait venir perturber la cicatrisation osseuse.
- d. Survient fréquemment lors de l'avulsion d'une dent lactéale.

19. Les extractions dentaires sont contre-indiquées dans les cas suivants :

- a. Une péricoronarite suppurée en rapport avec une 18 enclavée.
- b. Un patient porteur de prothèse valvulaire avec un INR égale à 4,90.
- c. Un patient porteur d'une prothèse valvulaire avec un INR égale à 2,30.
- d. Un patient diabétique mal équilibré sans aucune précaution particulière.

20. L'anesthésie tronculaire à l'épine de Spix :

- a. Est indiquée pour l'avulsion des incisives mandibulaires.
- b. Est réalisée chez les patients sous anticoagulants.
- c. Se fait avec vasoconstricteur.
- d. Toutes les réponses sont fausses.

Cochez UNE ou PLUSIEURS réponses :

- 1. Parmi les anomalies chronologiques, nous citons :**
  - a. Les dents néonatales qui sont présentes à la naissance.
  - b. La folliculite expulsive de Capdepont.
  - c. Le défaut primaire d'éruption.
  - d. La transposition qui est la permutation des positions de dents dents adjacentes.
- 2. La stérilisation :**
  - a. A pour objectif de prévenir le risque infectieux, surtout pour le patient que pour l'équipe soignante.
  - b. Vise à obtenir un état propreté microscopique à la surface de l'instrumentation.
  - c. S'effectue au moyen d'un thermos-désinfecteur dont le principe est de combiner la chaleur et pression élevée.
  - d. S'adresse uniquement aux dispositifs médicaux non dynamiques.
- 3. Parmi les indications locales de l'extraction de la dent de 6 ans, nous citons :**
  - a. Une ankylose de la formation par lésion osseuse avancée.
  - b. La présence d'une lésion péri-apicale volumineuse à l'origine d'une cellulite.
  - c. Une dyschromie.
  - d. Une fracture longitudinale radiculaire sous une couronne emfilée.
- 4. Parmi les conditions d'ouverture d'un cabinet dentaire :**
  - a. Local équipé d'appareil de radiographie panoramique obligatoire.
  - b. Le médecin dentiste doit être inscrit au conseil de l'ordre.
  - c. Un local suffisamment aéré et éclairé (lumière naturelle).
  - d. Doit être installé au rez-de-chaussée.
- 5. Dans la dentinogénèse imparfaite de type I :**
  - a. La denture permanente est moins atteinte que la denture temporaire.
  - b. Il n'y a pas d'ankylose osseuse.
  - c. La radiographie panoramique montre une anomalie de forme dentaire très caractéristique.
  - d. Présente les même caractéristiques cliniques que la dentinogénèse imparfaite de type II.
- 6. Le Tétrafluorodichloroéthane (Frijet®) :**
  - a. Est utilisé pour une anesthésie par réfrigération.
  - b. Est utilisé pour une anesthésie par infiltration.
  - c. Est indiquée en pré anesthésie chez les sujets anxieux.
  - d. Est indiqué pour l'avulsion de dent monoradiculée.
- 7. Le taurodontisme :**
  - a. Est une dysmorphie coronaire.
  - b. Survient quand un traumatisme mécanique affecte une dent temporaire et se répercute au niveau du germe définitif.
  - c. Affecte habituellement les molaires.
  - d. Peut constituer une entité clinique isolée ou être associé à une amélogénèse imparfaite.
- L'examen des aires ganglionnaires :**
  - a. Est obligatoire chez un patient diabétique déséquilibré.
  - b. Est systématique quel que soit le motif de consultation.
  - c. Doit être complété par un examen radiologique.
  - d. Toutes les réponses sont fausses.
- Lors de la luxation :**
  - a. La position du praticien est capitale pour effectuer un mouvement adéquat.
  - b. L'instrument utilisé est un élévateur tenu à plein main.
  - c. L'instrument est inséré dans le sillon gingivo-dentaire et permet, en contournant la dent, de sectionner l'épithéliale.
  - d. Il faut mobiliser la dent dans son alvéole en prenant appui sur la dent adjacente.



## Epreuve de Pathologie - 2ème - année médecine dentaire 2020/2021

Date de l'épreuve : 13/07/2021

Corrigé Type

Barème variable par question

N°	Rép.	Barème
1	BC	1
2	A	1
3	ABD	1
4	BC	1
5	ACD	1
6	AC	1
7	CD	1
8	D	1
9	AB	1
10	AC	1
11	D	1
12	ACD	1
13	CD	1
14	A	1
15	A	1
16	AD	1
17	AC	1
18	ABC	1
19	AB	1
20	D	1

Dr. SAÏDIK.  
Maître-Assistant en Pathologie  
et Chirurgie Buccales

PLATFORME

**RESIDENTAIRE**

QCM Médecine Dentaire